

Algorithme de gestion d'un cas de rougeole

Cas suspecté

Symptômes

- Fièvre
- Congestion nasale avec écoulement nasal
- Toux
- Conjonctivite (yeux rouges qui coulent)
- Yeux sensibles à la lumière
- Malaise généralisé
- **Par la suite**, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps

Référence : [Rougeole | Gouvernement du Québec \(quebec.ca\)](https://www.quebec.ca/rougeole)

La présentation clinique peut être atténuée chez les **personnes vaccinées** (rougeole modifiée) : [Algorithme décisionnel repérage et diagnostic de la rougeole](#)

[Fiche technique pour la gestion des cas et des contacts – La rougeole](#)
Incubation : 10 à 14 jours mais peut aller ad 21 jours
Contagion : 4 jours avant l'apparition cutanées et jusqu'à 4 jours après le début des éruptions

Précautions additionnelles (PA) Aériennes

Choix de chambre ou de salle

1^{er} choix : Pièce individuelle à pression négative

- Privilégier présence d'une antichambre (SAS)
- Informer l'utilisateur de demeurer dans la pièce fermée pour la durée des PA

2^e choix : Pièce individuelle avec porte et fenêtres fermées

- Garder porte et fenêtres fermées en tout temps
- Informer l'utilisateur de demeurer dans la pièce fermée pour la durée des PA

3^e choix : Selon le type de milieu et l'évaluation de la direction santé publique (DSPu)

- Gestion en cas par cas

Directives générales

- L'utilisateur doit conserver son masque de procédure si sortie de la pièce fermée
- Limiter la quantité de matériel qui entre dans la pièce fermée
- Privilégier l'utilisation de matériel réservé à l'utilisateur (exemple : chaise aisance, thermomètre)
- Privilégier l'utilisation du matériel médical à usage unique (MMUU)
- Nettoyer/désinfecter le matériel partagé entre les usagers après chaque utilisation
 - Se référer [Procédure relatif à la gestion du matériel non critique](#)

Liens utiles

MSSS :

- [Rougeole - Professionnels de la santé - MSSS \(gouv.qc.ca\)](#)
- [Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec \(quebec.ca\)](#)
- [Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons \(RRO\) | Gouvernement du Québec \(quebec.ca\)](#)

INESSS :

- [Outil d'aide à la décision repérage et diagnostic de la rougeole](#)

USAGER

Travailleur de la santé

CIUSSS : référence au PGR
Autre : référence au DSPu

Évaluation médicale rapide selon les trajectoires habituelles dans votre secteur
 Le clinicien doit se référer à [l'Algorithme décisionnel repérage et diagnostic de la rougeole](#) et [l'APPEL à la vigilance](#) pour critères évaluation et les directives

Rougeole suspectée
 Le clinicien doit aviser DSPu d'un cas suspecté : 418 666-7000, option 3, puis option 1

Test diagnostic pour confirmer le diagnostic

- **Écouvillon nasopharyngé** (suivre guide laboratoire : [Document | Gustav / Guide \(chudequebec.ca\)](#))

Lieux test dx possible selon trajectoire établie

- **Secteur autonome pour faire test diagnostic** : fait par les intervenants dans le site selon procédure habituelle
- **Autres secteurs** : selon recommandations DSPu
 - fait par intervenant de la Clinique mobile **OU**
 - fait au Bloc C (PSL)

NÉGATIF

Rougeole exclus non suspectée OU test négatif

USAGER

Maintenir l'étiquette respiratoire et PA selon le type de symptôme

[Protocole habituel](#)

Rougeole confirmée

Le médecin traitant ou laboratoire fait le suivi auprès de la DSPu
DSPu : 418 666-7000, option 3, puis option 1

Usager admis et hébergés : aviser Service de PCI avec le Formulaire [CN00558-Décl-suivi-infection-respiratoire.pdf \(gouv.qc.ca\)](#)

Autres secteurs : aviser la PCI selon recommandations de la DSPu
pci.ciusscn@ssss.gouv.qc.ca
 Le service de PCI est en soutien dans l'application de mesures

L'enquête épidémiologique sera coordonnée et les recommandations seront données par la DSPu

Pour toutes questions : vous référer à votre gestionnaire