

Algorithme d'évaluation pour précautions additionnelles préventives dans les urgences

En tout temps

Pour l'**USAGER** et l'**ACCOMPAGNATEUR**



Pour tous les **TRAVAILLEURS** :



Changer le masque :

- aux pauses et repas
- si mouillé ou souillé
- à la fin de la journée
- si vous le jugez nécessaire

ÉPI : Se référer aux affiches de PA pour port et retrait

Le masque peut être retiré dans les secteurs fermés par porte et murs complets qui sont réservés exclusivement aux travailleurs

SECTION À FAIRE LIRE PAR L'USAGER OU QUESTIONNER DANS UNE SALLE FERMÉE

Présentez-vous des lésions cutanées²

ET

au moins un symptôme nouveau ou aggravé :

- Fièvre
- Douleur articulaire
- Mal de tête
- Mal de dos
- Douleur musculaire

OU

Présentez-vous des lésions cutanées² au niveau génital, anal ou autour de la bouche pour lesquelles vous n'avez pas eu de diagnostic antérieur ?

OUI

Au cours des 21 derniers jours, avez-vous eu un :

- Contact significatif¹ avec un cas confirmé de variole simienne
- **Homme seulement :** contact sexuel avec un homme de la région de Montréal ou d'une région limitrophe (ex. : Laurentides, Montérégie)

OUI

Si risque de variole simienne

- Diriger l'usager vers un bureau ou une salle de traitement réservée (ne pas diriger vers la salle d'attente)
- Référer au médecin en priorité
- PA aériennes/contact avec protection oculaire

PRÉCAUTIONS AÉRIENNES/CONTACT RENFORCÉES

- Salle à pression négative avec porte fermée

OU

- Salle avec porte fermée

- Effectuer une désinfection terminale de la salle avant de voir un autre usager (pas de temps d'attente, le changement d'air si absence de salle pression négative)

NON

Questionner si au cours des 14 derniers jours

NON

- Contact étroit (sans ÉPI) à moins de 2 mètres pendant au moins 15 minutes avec un cas de COVID-19
- Travaillant ou résidant dans un milieu en surveillance ou en éclosion de COVID-19
- Séjour à l'extérieur du Canada de plus de 48 h
- Retour de voyage d'un pays visé par une [surveillance MRSI](#)

OUI

Questionner s'il y a présence dans les 10 derniers jours de :

un résultat positif à la covid-19 **OU**

18 ans et plus

Un des symptômes suivants :

- Fièvre (> 37,8°C fièvre gériatrique ou > 38,1°C buccale ou ≥ 38,5°C rectale)
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Difficultés respiratoires
- Anosmie (perte de l'odorat) d'apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans aguesie (perte du goût)
- Mal de gorge

6 à 17 ans

Un des symptômes suivants :

- Fièvre (température buccale ≥ 38,1°C)
- Perte soudaine de l'odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement
- Difficulté à respirer
- Mal de gorge

Pédiatrique (0 à 5 ans)

- Fièvre (température rectale ≥ 38,5°C)
- Toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement ou difficulté respiratoire
- Mal de gorge
- Fièvre (température rectale ≥ 38,1°C)
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées
- Fièvre (température rectale ≥ 38,1°C)

OU

Au moins 2 symptômes dans les suivants :

- Fatigue intense
- Nausée ou vomissement
- Diarrhée
- Céphalée
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Perte d'appétit importante
- Douleur abdominale
- Rhinorrhée ou congestion nasale de cause inconnue

OUI



Section salle d'attente réservée

Consultation dans le bureau habituel

Appliquer les précautions additionnelles selon le Guide décisionnel visant à prévenir et contrôler la transmission des infections dans les urgences et les milieux sans rendez-vous médical ou avec accès adapté, selon la raison de consultation.

Si risque de MRSI (ex. : pays à haut risque de grippe aviaire)

- Référer au médecin en priorité
- Diriger l'usager et l'accompagnateur vers un bureau ou une salle de traitement réservée (ne pas diriger vers la salle d'attente)

Appliquer les précautions additionnelles selon le Guide décisionnel visant à prévenir et contrôler la transmission des infections dans les urgences et les milieux sans rendez-vous médical ou avec accès adapté.

NON

Salle d'attente

Pour tout type de clientèle, en tout temps et pour tous les types d'intervention

=

Pratiques de base



1 Personne dont la peau ou une muqueuse a été en contact direct avec des lésions cutanées ou avec des liquides biologiques ou des surfaces et objets contaminés par les liquides biologiques, incluant les vêtements et la literie du cas OU contact à moins d'un mètre face à face pendant 3 heures ou plus (cumulatif sur 24 h) sans masque de procédure.

2 Macules, papules, vésicules, pustules, ulcères, lésions croutées