

MILIEUX VISÉS PAR L'ENCADREMENT DES AIDES- SOIGNANTS

DOUBLE VÉRIFICATION INDÉPENDANTE (DVI)



QUOI

Processus au cours duquel un 2^e intervenant (vérificateur) vérifie le médicament préparé par un autre intervenant (le préparateur) sans être influencé par celui-ci.

QUAND

- Pour certains médicaments qui présente un risque plus élevé
- Lorsque l'infirmière l'indique dans les directives

Voici des exemples de médicament qui sont considérés comme à risque élevé : Warfarine (Coumadin^{MD}), Hydromorphone (Dilaudid^{MD}), Clozapine, Insuline, etc.

POURQUOI

C'est un moyen efficace pour trouver les erreurs de préparation et éviter leurs conséquences.

PAR QUI

Tous ceux qui donnent de la médication aux usagers dans les milieux visés par la Règle de soins nationale ACTIVITÉS DE SOINS CONFIEES À DES AIDES-SOIGNANTS.

COMMENT

Il y a deux rôles à jouer :

Le préparateur :

Celui qui va préparer le médicament en premier. Exemple ; Choisir la dose dans le stylo à insuline.

Le vérificateur :

Une 2^e personne qui passe après le préparateur (**sans lui avoir parlé**) pour vérifier une 2^e fois qu'il n'y a pas d'erreur dans la préparation du médicament.

EXEMPLES

Lorsque vous êtes 2 intervenants :

			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Vérificateur</div> <p style="text-align: center;">N.B. / J.A</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">Préparateur</div>
<p>Préparateur</p> <p>Julie doit administrer de l'insuline à M. Tremblay. Elle prend donc sa FADM pour effectuer sa préparation.</p>	<p>Julie demande ensuite à sa collègue Nadine d'aller faire une DVI. Elle laisse à Nadine le stylo d'insuline avec la FADM à l'endroit habituel.</p>	<p>Vérificateur</p> <p>Nadine vient vérifier (sans avoir parlé à Julie) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bon médicament • Bonne dose • Bon patient • Bonne voie • Bon moment <p>Si tout est pareil, elle met ses initiales sur la FADM et avise Julie.</p>	<p>Julie administre ensuite l'insuline et elle met ses initiales sur la FADM à côté de celles de Nadine.</p>



Attention, lorsque vous demandez l'aide de votre collègue, il ne faut PAS lui donner les informations :

« Nadine, peux-tu venir vérifier mes 2 unités d'insuline préparées pour M. Tremblay? »

« Nadine, peux-tu venir vérifier la dose d'insuline préparée pour M. Tremblay ? » ✓

Lorsque vous êtes seul dans votre milieu, il faut faire les étapes de l'autovérification.

1. Faire la préparation comme d'habitude.
2. Prendre une pause.
3. Recommencer les étapes de préparation une 2^e fois. Il est aussi possible de faire la 2^e vérification en faisant votre démarche à l'envers. Vous commencez par vérifier le médicament que vous avez préparé et vous regardez ensuite votre FADM.



Prendre une pause entre vos 2 étapes vous permet d'éviter de faire la vérification de façon automatique. Vous aurez tendance à être plus alerte!

RÉFÉRENCES.

- CIUSSS CN (2019), Procédure PR-PHARM-004 Procédure de gestion des médicaments de niveau d'alerte élevé
- Images obtenues sur les sites Shutterstock et pixabay