

Administration de la médication par les voies buccales

Voies buccales :

- Sublinguale (S/L) : sous la langue (site A).
- Bucco-gingivale: entre la muqueuse jugale et la gencive inférieure (sites 1, 2 et 3).


Absorption améliorée avec voie bucco-gingivale car contrairement à la voie S/L, cette voie ne déclenche pas le réflexe salivaire et la déglutition.

Privilégier voie bucco-gingivale chez patients :


- Inconscients;
- Dysphagiques;
- Présentant une salivation excessive;
- Avec difficulté à maintenir la médication sous la langue.

Voie bucco-gingivale :

- Élever un peu la tête de lit.
 - Si débris présents, les retirer à l'aide d'une toothette.
 - La muqueuse doit être plutôt sèche; l'humidifier si elle est très sèche.
 - Administration de la médication.
 - Préparation de la médication :
 1. Écraser le comprimé.
 2. **Diluer avec la plus petite quantité d'eau possible : idéalement < 0,5 ml d'eau.** Si volume > 0,5 ml : administrer dans deux sites ou administrer en deux étapes soit 0,5 ml et attendre qu'il soit absorbé complètement et répéter.
 3. Possibilité d'utiliser une formulation liquide ou médicament injectable, ainsi dilution non nécessaire, mais le volume administré doit également être < 0,5 ml par site.
 4. Mettre la dilution dans une seringue sans aiguille et administrer dans un des sites.
 - Masser légèrement la joue.
- Contactez votre pharmacien pour toute autre question ou pour avoir plus de précision.**



Zone à favoriser chez un patient inconscient car peu de risque d'aspiration.



Administration par voie sublinguale ou bucco-gingivale

Médicament	Commentaires
Alprazolam (Xanax ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnels
Bromazépam (Lectopam ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnels
Clomipramine (Anafranil ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnels
Clonazépam (Rivotril ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnels
Dimenhydrinate (Gravo ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation du comprimé de marque générique (comprimé compacté plutôt qu'enrobé)
Lorazépam (Ativan ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnelsEssais positifs à l'unité de soins palliatifs à Charlesbourg
Méthotriméprazine (Nozinan ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation des comprimés conventionnelsEssais positif à l'unité de soins palliatifs à Charlesbourg
Midazolam (Versed ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation de la solution injectable
Opioïdes Fentanyl Hydromorphone Méthadone Morphine Sufentanil	<ul style="list-style-type: none">Utilisation de comprimés à libération rapide ou solutions injectablesEffets indésirables : goût amer et sensation de brûlure (morphine > hydromorphone > fentanyl)Pour le fentanyl et le sufentanil, utiliser solution injectableMéthadone : utiliser la solution
Prochlorpérazine (Stémétil ^{MD})	<ul style="list-style-type: none">Utilisation du comprimé de marque générique (comprimé compacté plutôt qu'enrobé)
Scopolamine	<ul style="list-style-type: none">Utilisation de la solution injectable

Références : Guide pratique des soins palliatifs et essais à l'unité des soins palliatifs au foyer de Charlesbourg.