



Arbre décisionnel en présence de SCPD



La gestion des refus des résidents : Algorithme

Qu'il s'agisse de la prise de médication ou de l'assistance aux soins d'hygiène quotidienne, il arrive qu'un patient fasse preuve de résistance face à nos interventions et que nous ayons à décider de l'approche à privilégier dans la gestion des refus. Voici un algorithme pouvant guider l'équipe soignante lors de telles situations. Même si un patient est inapte, il a le droit de refuser toute intervention le concernant. L'équipe soignante doit s'efforcer de respecter le refus, tenter de comprendre les motifs pouvant expliquer le refus exprimé et adopter l'approche appropriée.



Démarche décisionnelle Utilisation des antipsychotiques en PRN en présence d'un trouble du comportement

TROUBLE DU COMPORTEMENT

Est-ce que l'approche est appropriée?

OUI

Est-ce que le recadrage est possible?

OUI

Changer la perception du soignant concernant le comportement

Appliquer l'intervention et modifier le PTI en conséquence

NON

Est-ce que des stratégies d'intervention de base sont possibles?

- Validation
- Diversion
- Modifications de l'environnement
- Écoute active adaptée
- Toucher affectif

OUI

Administer le PRN et compléter l'examen clinique pour identifier les causes sous-jacentes du comportement

NON

NON

Modifier l'approche

NON

Est-ce qu'il y a danger immédiat pour la personne ou pour autrui ou la personne a-t-elle une souffrance psychologique sévère?

OUI

Compléter l'examen clinique pour identifier les causes sous-jacentes

NON

Démarche décisionnelle Utilisation des benzodiazépines en PRN en présence d'un trouble du comportement

TROUBLE DU COMPORTEMENT

Est-ce que l'approche est appropriée?

OUI

Est-ce que le recadrage est possible?

NON

Modifier l'approche

NON

Est-ce que des stratégies d'intervention de base sont possibles?

- Validation
- Diversion
- Modifications de l'environnement
- Écoute active adaptée
- Toucher affectif

OUI

Changer la perception du soignant concernant le comportement

NON

Appliquer l'intervention et modifier le PTI en conséquence

Est-ce qu'un trouble anxieux ou du sommeil peut expliquer le comportement?

OUI

Administer le PRN et compléter l'examen clinique pour identifier si d'autres causes contribuent au comportement

NON

Compléter l'examen clinique pour identifier les causes sous-jacentes