

MARCHE À SUIVRE POUR LES AIDES-SOIGNANTS LORS DE L'APPARITION DE SYMPTÔMES RESPIRATOIRES ET GASTRO-INTESTINAUX CHEZ UN USAGER

Interventions rapides à réaliser par l'aide-soignant lors de l'apparition de nouveaux symptômes

- Demander à l'usager de rester à sa chambre ou l'accompagner vers celle-ci
- Mettre en place les précautions additionnelles (affiche gouttelettes-contact) à la porte de la chambre, ainsi que le matériel nécessaire (gants, blouse, masque)
- Valider auprès de l'usager la présence d'un ou plusieurs symptômes en se référant au tableau ci-dessous avant de contacter l'infirmière



Symptômes

Est-ce que l'usager présente:

- Toux (nouvelle)
- Fièvre (personne âgée : à partir de 37,8 °C buccale; adulte et pédiatrique : à partir de 38 °C buccale)
- Mal de cœur (nausée)
- Vomissement
- Mal de ventre
- Diarrhée (selles liquides)

Par la suite :

- Aviser l'infirmière ou infirmière auxiliaire ou tout autre professionnel selon les trajectoires de communication de votre milieu et suivre les recommandations
- Si l'infirmière vous le demande, compléter le *Formulaire d'observations par l'aide-soignant de l'usager présentant des symptômes infectieux (CN00718)*

Si l'usager refuse de demeurer à sa chambre :

- Reconduire l'usager présentant des symptômes à sa chambre le plus souvent possible
- Désinfecter les surfaces fréquemment touchées (ex. : poignées de porte, interrupteurs de lumière, rampes) le plus souvent possible
- Favoriser une distanciation d'au moins 2 mètres entre les usagers
- Laver souvent les mains des usagers (ex. : avant les repas, avant une activité)



L'aide-soignant doit informer tout changement (amélioration ou détérioration) dans la condition de l'usager et doit attendre les directives de l'infirmière ou de l'infirmière auxiliaire avant de retirer les précautions additionnelles.