

1. Surveiller si le résident a un de ces symptômes :

Fièvre

Personne âgée : à partir de 37,8 °C
Adulte et enfant : à partir de 38 °C

Toux

Vomissement

Diarrhée
(selle liquide)

2. Demander au résident de rester à sa chambre/appartement et installer rapidement :

À l'entrée de la chambre/appartement :

- Affiche gouttelettes-contact
- Matériel nécessaire (gants, blouses, masques, solution hydroalcoolique, produit désinfectant)

À l'intérieur de la chambre/appartement :

- Poubelle




3. Aviser l'infirmière ou infirmière auxiliaire ou tout autre professionnel selon la trajectoire de communication de votre milieu et **appliquer les directives** :

- À la demande de l'infirmière, remplir le *Formulaire d'observations par l'aide-soignant de l'usager présentant des symptômes infectieux* (CN00718)

Si le résident refuse de demeurer à sa chambre :

2 mètres



- Laver les mains de l'usager souvent (ex. : chaque fois qu'il sort de sa chambre)
- Reconduire l'usager à sa chambre le plus souvent possible
- Favoriser une distance de 2 mètres avec les autres dans les aires communes :
 - Dédier une place si possible
 - Désinfecter la chaise ou le fauteuil et l'environnement lorsqu'il quitte
- Désinfecter les surfaces et les objets touchés par l'usager



Informez l'infirmière ou l'infirmière auxiliaire de tout changement (amélioration ou détérioration) dans la condition de l'usager.

Attendez ses directives avant de retirer les précautions additionnelles.