

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2020-2021

	AFLURIA TETRA (Seqirus)	AGRIFLU (Seqirus)	FLUAD (Seqirus)	FLUAD PÉDIATRIQUE (Seqirus)	FLUCELVAX QUAD (Seqirus)	FLULAVAL TETRA (GSK)
Type de vaccin	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Trivalent, inactivé, sous unitaire	Trivalent, inactivé, sous unitaire	Trivalent, inactivé, sous unitaire	Quadrivalent, inactivé, sous-unitaire (culture cellulaire de mammifère)	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés
Posologie et voie d'administration	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,25 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	5 ans et plus	6 mois et plus	65 ans et plus	6 à 23 mois	9 ans et plus	6 mois et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les <u>indications du PIQ</u> Disponible uniquement dans le cadre du programme public
Contre-Indication	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précaution	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave	Antécédents de : • SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale • SOR grave
Présentation	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,25 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Fiole multidose de 5 ml
Durée de conservation	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole seulement)	28 jours suivant la date d'ouverture (fiole seulement)	Non applicable	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture (fiole seulement)	28 jours suivant sa date d'ouverture
Adjuvant	Aucun	Aucun	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	MF59C.1 (contient du squalène, du Polysorbate 80, du trioléate de sorbitan, du citrate de sodium et de l'acide citrique)	Aucun	Aucun
Thimérosal	50 µg/dose (fiole de 5 ml)	50 µg/dose (fiole 5 ml)	Non	Non	Présence de thimérosal (fiole de 5 ml)	50 µg/dose
Trace d'antibiotique	Néomycine, polymyxine B	Néomycine, kanamycine	Néomycine, kanamycine	Néomycine, kanamycine	Aucune trace	Aucune trace
Autre ingrédient (présence à l'état de trace ou en quantité résiduelle)	Protéines d'œuf, taurodéoxycholate de sodium, bêta-propiolactone, hydrocortisone, saccharose, chlorure de calcium, l'hydrogénophosphate de disodium (anhydre), dihydrogénophosphate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, Polysorbate 80, baryum, citrates, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, chlorure de calcium dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, baryum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, dichlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Protéines d'œuf, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium, baryum, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate acide de potassium, phosphate disodique dihydraté, dichlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de calcium dihydraté	Bêta-propiolactone, bromure de cétyltriméthylammonium, Polysorbate 80, phosphate disodique dihydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, dihydrogénophosphate de potassium, chlorure de sodium	Protéines d'œuf, Polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, formaldéhyde, sucrose, éthanol, désoxycholate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de disodium heptahydraté, phosphate de sodium dihydraté
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Légende :

SGB : Syndrome de Guillain-Barré

SOR : Syndrome oculorespiratoire

AAS : Acide acétylsalicylique

■ : Vaccin disponibles dans le cadre du PIQ

Adapté de : ASPC, *Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2020-2021.*

INFORMATION SUR LES VACCINS ANTIGRIPPAUX DISTRIBUÉS AU QUÉBEC – SAISON 2020-2021

	FLUMIST QUADRIVALENT (Astra Zeneca)	FLUVIRAL (GSK)	FLUZONE HAUTE DOSE (Sanofi Pasteur)	FLUZONE QUADRIVALENT (Sanofi Pasteur)	INFLUVAC TETRA (BGP Pharma ULC)
Type de vaccin	Quadrivalent, vivant atténué	Trivalent, inactivé, virions fragmentés	Trivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, inactivé, virions fragmentés	Quadrivalent, inactivé, sous unitaire
Posologie et voie d'administration	Intranasal 0,2 ml (0,1 ml dans chaque narine)	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM	0,5 ml IM
Âge homologué	2 à 59 ans	6 mois et plus	65 ans et plus	6 mois et plus	3 ans et plus
Clientèle visée par le programme de vaccination	Enfants âgés de 2 à 17 ans décrits dans les indications du PIQ Disponible aussi sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)	Résidents âgés de 65 ans et plus des CHSLD et des ressources intermédiaires, se référer aux indications du PIQ Disponible aussi sur le marché privé (\$)	Personnes âgées de 6 mois et plus décrites dans les indications du PIQ Disponible aussi sur le marché privé (\$)	Disponible uniquement sur le marché privé (\$)
Contre-indication	<ul style="list-style-type: none"> Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs) État d'immunodépression Grossesse Asthme grave ou respiration sifflante active (ayant nécessité une intervention médicale au cours des 7 jours précédents la vaccination) Prise d'AAS chez les personnes âgées de moins de 18 ans 	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)	Anaphylaxie à une dose antérieure ou à un composant du vaccin (excluant les œufs)
Précaution	<ul style="list-style-type: none"> Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave Sécrétions nasales importantes Adultes souffrant d'asthme grave ou ayant d'autres troubles chroniques Contact avec personnes très gravement immunodéprimées requérant un isolement en milieu protégé 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave 	Antécédents de : <ul style="list-style-type: none"> SGB survenu dans les 6 semaines suivant une vaccination antigrippale SOR grave
Présentation	Vaporisateur 0,2 ml	Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml	Seringue de 0,5 ml Fiole multidose de 5 ml	Seringue de 0,5 ml
Durée de conservation	Non applicable	28 jours suivant sa date d'ouverture	Non applicable	Jusqu'à la date de péremption	Non applicable
Adjuvant	Non	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun
Thimérosal	Non	50 µg/dose	Non	50 µg/dose (fiole de 5 ml)	Non
Trace d'antibiotique	Gentamicine	Aucune trace	Aucune trace	Aucune trace	Gentamicine, néomycine, polymyxine B
Autre ingrédient (présence à l'état de trace ou en quantité résiduelle)	Protéines d'œuf, hydrolysate de gélatine porcine de type A, saccharose, chlorhydrate d'arginine, glutamate monosodique, l'hydrogénophosphate de dipotassium, dihydrogénophosphate de potassium	Protéines d'œuf, Polysorbate 80, hydrogénosuccinate d'α-tocophérol, sucrose, éthanol, formaldéhyde, désoxycholate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, phosphate de disodium heptahydraté, phosphate de sodium dihydraté	Protéines d'œuf, Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium	Protéines d'œuf, Triton X-100, formaldéhyde, chlorure de sodium isotonique tamponné au phosphate de sodium	Protéines d'œuf, chlorure de calcium déshydraté, phosphate disodique déshydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, chlorure de potassium, phosphate monobasique de potassium, chlorure de sodium, bromure de cétyltriméthylammonium, protéines de poulet, formaldéhyde, hydrocortisone, Polysorbate 80, citrate de sodium, saccharose, tartrate de tylosine
Latex naturel	Absence	Absence	Absence	Absence	Absence

Légende :

SGB : Syndrome de Guillain-Barré

SOR : Syndrome oculorespiratoire

AAS : Acide acétylsalicylique

■ : Vaccin disponibles dans le cadre du PIIQ

Adapté de : ASPC, Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2019-2020, Annexe A ; Caractéristiques des vaccins antigrippaux offerts au Canada, 2020-2021.

2020-09-25 | Groupe sur l'acte vaccinal