Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale Ouébec 🗸 🕷



Précautions additionnelles (PA) Aériennes

USAGER

### Choix de chambre ou de salle

**1**<sup>er</sup> **choix** : Pièce individuelle à pression négative

- Privilégier présence d'une antichambre (SAS)
- Informer l'usager de demeurer dans la pièce fermée pour la durée des PA

**2e choix :** Pièce individuelle avec porte et fenêtres fermées

- Garder porte et fenêtres fermées en tout temps
- Informer l'usager de demeurer dans la pièce fermée pour la durée des PA
- 3e choix: Selon le type de milieu et l'évaluation de la direction santé publique (DSPu)
  - Gestion en cas par cas

### Directives générales

- L'usager doit conserver son masque de procédure si sortie de la pièce fermée
- Limiter la quantité de matériel qui entre dans la pièce fermée
- Privilégier l'utilisation de matériel réservé à l'usager (exemple: chaise aisance, thermomètre)
- Privilégier l'utilisation du matériel médical à usage unique
- Nettoyer/désinfecter le matériel partagé entre les usagers après chaque utilisation
  - Se référer Procédures générales de nettoyage/désinfection du matériel non-critique <u>partagé</u>

# • Liens utiles


### MSSS:

Rougeole - Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca) Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca) Vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons (RRO) |

**INESSS:** 

Outil d'aide à la décision repérage et diagnostic de la rougeole .

## Algorithme de gestion d'un cas de rougeole Cas suspecté Fiche technique pour la gestion des cas et des contacts – La rougeole **Symptômes** Incubation: 10 à 14 jours mais peut aller ad 21 jours Fièvre Contagion : 4 jours avant l'apparition cutanées et jusqu'à 4 jours après le début des éruptions • Congestion nasale avec écoulement nasal Contact étroit d'un cas confirmé de rougeole Contact considéré comme protégé : Aucune PA Conjonctivite (yeux rouges qui coulent) Contact considéré comme NON protégé : PA aériennes débutant le 5e jour Yeux sensibles à la lumière après la première exposition et ce, jusqu'au 21e jour suivant le dernier contact Malaise généralisé A..... Par la suite, des rougeurs apparaissent au visage puis sur le corps Référence: Rougeole | Gouvernement du Québec (quebec.ca) Travailleur de la santé **CIUSSS**: référence au PGR La présentation clinique peut être atténuée chez les personnes vaccinées (rougeole modifiée) : Autre: référence au DSPu Algorithme décisionnel repérage et diagnostic de la rougeole **Évaluation médicale rapide** selon les trajectoires habituelles dans votre secteur Rougeole suspectée



L'enquête épidémiologique sera coordonnée et les recommandations seront données par la DSPu

Le service de PCI est en soutien dans l'application de mesures

Pour toutes questions : vous référer à votre gestionnaire

Gouvernement du Québec (quebec.ca)