

Tableau des antidotes

Antidote	Dose	Technique d'utilisation	Commentaire
Dexrazoxane Agents impliqués : DAUNOrubicine DOXOrubicine Épirubicine IDArubicine	<ul style="list-style-type: none"> – 1 000 mg/m² (maximum 2 000 mg/dose) jours 1-2 – 500 mg/m² (maximum 1 000 mg/dose) jour 3 	<ul style="list-style-type: none"> – Préparation par le département de pharmacie – Administrer dans le bras opposé à l'extravasation, le plus possible, dans une veine de gros calibre – Perfusion intraveineuse en 1 heure* (utiliser immédiatement après reconstitution) – Débuter le plus tôt possible (maximum de 6 heures) suivant l'extravasation 	<ul style="list-style-type: none"> – Éviter l'application de compresses froides 15 minutes avant pour ne pas restreindre l'arrivée du médicament au site d'action – Réduire la dose de 50 % pour Clcr inférieur à 40 mL/min
DMSO 99 % p. ex. : anthracyclines [†] mitomycine C	<ul style="list-style-type: none"> – 4 gouttes/10 cm² aux 6 à 8 heures pour 7 à 14 jours à débiter dans les 10 minutes suivant l'extravasation 	<ul style="list-style-type: none"> – Disponible dans les coffrets d'urgence sur le département de la salle de traitement en oncologie – Appliquer sur une surface 2 fois plus grande que la zone touchée – Utiliser un compte-gouttes en verre pour appliquer et étendre à l'aide d'un coton-tige 	<ul style="list-style-type: none"> – Laisser sécher – Ne pas couvrir d'un pansement occlusif (risque de formation de phlyctènes)
Hyaluronidase Agents impliqués : VinBLAStine VinCRIStine Vinorelbine	<ul style="list-style-type: none"> – Jusqu'à 1 500 unités – Hyaluronidase : fiole de 1 500 unités à diluer avec 1 ml d'eau stérile pour injection ou de NaCl 0,9 % 	<ul style="list-style-type: none"> – Disponible dans les coffrets d'urgence sur le département de la salle de traitement en oncologie – 5 injections sous-cutanées de 0,2 ml en étoile autour du site de l'extravasation avec une aiguille de 25 G ou moins – Changer l'aiguille à chaque injection 	<ul style="list-style-type: none"> – Disponible par le Programme d'Accès Spécial de Santé Canada

[†] Pour daunorubicine, doxorubicine, épirubicine et idarubicine, utilisez DMSO 99 % SEULEMENT SI la dexrazoxane n'est pas disponible ou si son administration ne peut commencer dans les six heures suivant l'événement. Ne pas utiliser DMSO 99 % et la dexrazoxane en concomitance