

PRISE EN CHARGE CÉSARIENNE SELON NIVEAU URGENCE-ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

Référer au protocole médical CIUSSSCN-PRO-2022-04 : Prise en charge d'une césarienne selon le niveau d'urgence.

Intolérances et allergies vérifiées

CÉSARIENNE DE PRIORITÉ 1

Cesser Ocytocine Retirer le dispositif de Dinoprostone (Cervidil) Retirer la sonde endocervicale

- Faire une formule sanguine complète (FSC) plus groupe sanguin et recherche d'anticorps si absent ou si fait depuis plus de 72 heures.
- Demander 2 culots globulaires en réserve.
- Installer un cathéter intraveineux 18G, si absent.
- Installer de l'oxygène à 3 l/min par lunette nasale à l'arrivée en salle d'opération.

CÉSARIENNE DE PRIORITE 2

Cesser Ocytocine Retirer le dispositif de Dinoprostone (Cervidil) Retirer la sonde endocervicale

- Faire une formule sanguine complète (FSC) plus groupe sanguin et recherche d'anticorps si absent ou si fait depuis plus de 72 heures.
- Demander 2 culots globulaires en réserve.
- Installer un cathéter intraveineux 18G, si absent.
- Administrer 30 ml de solution de Dicitrate de Sodium par voie orale avant le départ pour le bloc opératoire.
- Installer une sonde urinaire.

CÉSARIENNE DE PRIORITE 3

Cesser Ocytocine Retirer le dispositif de Dinoprostone (Cervidil) Retirer la sonde endocervicale

- Faire une formule sanguine complète (FSC) plus groupe sanguin et recherche d'anticorps si absent ou si fait depuis plus de 72 heures.
- Demander 2 culots globulaires en réserve.
- Installer un cathéter intraveineux 18G, si absent.
- Administrer 30 ml de solution de Dicitrate de Sodium par voie orale avant le départ pour le bloc opératoire.
- Installer une sonde urinaire.

CÉSARIENNE DE PRIORITE 4

- Faire une formule sanguine complète (FSC) plus groupe sanguin et recherche d'anticorps si absent ou si fait depuis plus de 72 heures.
- Demander 2 culots globulaires en réserve.
- Administrer la médication usuelle à l'usagère.
- Installer un cathéter intraveineux 18G, si absent.
- Surveillance du cœur fœtal :
 - Grossesse sans facteurs de risque : auscultation intermittente (AI) aux heures.
 - Grossesse avec facteurs de risque : monitoring fœtal électronique (MFE) avec interprétation du tracé aux 15 minutes.
 - Autre _____

Date _____ Heure _____ Signature _____ Numéro de permis _____
aaaa/mm/jj hh:mm Médicale (ou autorisée)

Adopté par le comité de pharmacologie le 26 janvier 2022.