

RÉPLÉTION INTRAVEINEUSE EN POTASSIUM ADULTE ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

Direction clinique _____	Programme _____	Site _____
Si possible, favoriser une prescription par la voie entérale puisque le potassium est bien absorbé par le tractus gastro-intestinal.		
Poids _____ kg	Taille _____ cm	Surface corporelle _____ m ²
Allergies _____ Intolérances _____		
Créatinine sérique : _____ mcmol/l	Kaliémie : _____ mmol/l	Magnésémie : _____ mmol/l
Une hypokaliémie pourra difficilement être corrigée adéquatement en présence d'une hypomagnésémie.		
Chlorure de potassium Ne pas administrer en même temps que du phosphate de potassium Par voie intraveineuse périphérique ou centrale. Chlorure de potassium 10 mEq dans 100 ml d'eau stérile (sac prédilué) à perfuser en 1 heure. À répéter pour un total de _____ mEq (dose usuelle de 20 à 40 mEq par 24 heures si fonction rénale normale).		
Date _____ aaaa/mm/jj	Heure _____ hh:mm	Signature _____ Profession _____ Numéro permis _____
Approuvée par le comité de pharmacologie le 28 février 2024		
Légende : cm : centimètre kg : kilogramme l : litre m ² : mètre carré mcmol : micromole mEq : milliequivalent ml : millilitre mmol : millimoles		
Section réservée pour la signature électronique		