

## ORDONNANCE COLLECTIVE (O.C.)


|   |   |
|---|---|
| <b>OBJET : NYSTATINE<br/>(MYCOSTATIN<sup>MC</sup>, NILSTAT<sup>MC</sup>)</b>  | <b>CODE : O. C. 31</b>  |
| <b>DÉFINITION : Antifongique</b>  | <b>ACCEPTÉE PAR :</b><br>- Le Comité de pharmacologie le : <u>2005-05-11</u><br>- L'exécutif du CMDP le : <u>2005-06-22</u><br>- L'exécutif du CII le : <u>2005-05-03</u><br><b>RÉVISÉE LE : 2015-02-04</b> |
| <b>Utilisateurs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Infirmières des centres d'hébergement;</li><li>➤ Infirmières du soutien à domicile (SAD);</li><li>➤ Infirmière de l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI)</li></ul>  |   |
| <b>Clientèle visée</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Centres d'hébergement;</li><li>➤ Soins palliatifs à domicile;</li><li>➤ URFI</li></ul>   |   |
| <b>Indication</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Candidose buccale.</li></ul>  |   |
| <b>Contre-indication</b> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Allergie ou intolérance à une composante du produit;</li><li>➤ Infection systémique;</li><li>➤ Résistance au produit ou inefficacité.</li></ul>  |   |
| <b>Ordonnance / posologie</b> <p>Nystatine 100 000 unités/mL (Nilstat<sup>MC</sup>, Mycostatin<sup>MC</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Administrer 5 mL (500 000 unités) quatre fois par jour de préférence après le repas et au coucher;</li><li>➤ Badigeonner les parois de la bouche ou gargariser pendant une minute et faire avaler la solution;</li><li>➤ Réévaluer par le médecin dans les 48 heures suivant la première dose.</li></ul>   |   |
| <b>ALERTE NURSING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Un traitement efficace doit débuter par une posologie de 500 000 unités soit 5 mL.</li><li>◆ Attendre 30 minutes pour boire ou manger après l'administration de nystatine.</li><li>◆ Le nettoyage de la bouche et des prothèses dentaires avec bicarbonate de soude dans l'eau doit suivre le traitement de nystatine en prévention.</li><li>◆ Si utilisation buccale de la chlorhexidine, attendre une heure avant l'application de nystatine.</li></ul> |   |

Signature (président du CMDP) :



Date : 2015-03-31

Signature (Directrice en soins infirmiers) :



Date : 2015-03-10