

PROTOCOLE DE SOINS (P. S.)

OBJET : TRAITEMENT DE L'HYPOGLYCÉMIE

CODE : P. S. 20

DÉFINITION : Démarche d'interventions pour hypoglycémie

ACCEPTÉ PAR :

- Le Comité de pharmacologie le : 2005-05-11
- L'exécutif du CMDP le : 2005-06-22
- L'exécutif du CII le : 2005-05-03

Révisé le : 2015-02-04

PROCÉDURES D'INTERVENTIONS


PARAMÈTRES DE SOINS ET DE SURVEILLANCE ET ORDONNANCES MÉDICALES

HYPOGLYCÉMIE GRAVE

HYPOGLYCÉMIE LÉGÈRE À MODÉRÉE

1 GLYCÉMIE INFÉRIEURE À 2,8 mmol/L

2 GLYCÉMIE 2,8 À 3,9 mmol/L



ALERTE NURSING


◆ Contre-indication du glucagon :

- Allergie ou intolérance à une composante du produit;
- Usager conscient;
- Insulinome (tumeur du pancréas);
- Phéochromocytome (tumeur de la surrénale).

◆ Utiliser la trousse glucagon en poudre lyophilisée et diluant :

- Diluer avec le solvant fourni seulement (seringue préremplie de 1 mL);
 - Agiter la fiole **DOUCEMENT** jusqu'à ce que le glucagon soit dissout et la solution limpide;
 - Utiliser le glucagon uniquement si la solution est limpide et a la consistance de l'eau;
 - Utiliser la seringue graduée fournie pour retirer la solution de la fiole;
 - Injecter s/c de préférence sur le bras ou la cuisse
 - Utiliser immédiatement après la reconstitution
- ◆ Si l'usager est traité avec acarbose (Glucobay^{MC}) le traitement de l'hypoglycémie doit absolument être fait avec du lait ou du miel. Le traitement avec jus, sucre ou tout autre produit sucré sera inefficace.

Signature (président du CMDP) :



Date : 2015-03-31

Signature (Directrice des soins infirmiers) :



Date : 2015-03-10