

**ORDONNANCE
INDIVIDUELLE
(O.I.)**

OBJET : SÉDATION PROCÉDURALE À L'URGENCE

CODE : O.I. 26

ALLERGIE : _____ **POIDS :** _____ **kg**

ACCEPTÉE :

PROCÉDURE : _____

Comité de pharmacologie le : 2013-12-04

Exécutif du CMDP le : 2013-01-30

Exécutif du CII le : 2013-12-13

DATE : _____ **HEURE :** _____

RÉVISÉE LE

Généralités :

- Les posologies au verso sont à titre indicatif seulement.
- Certains usagers peuvent ne pas tolérer les intervalles posologiques proposés, la combinaison de médicaments peut avoir un effet synergique sur la dépression respiratoire et cardiovasculaire, la posologie devrait être ajustée au besoin.
- Envisager une réduction des doses (de 10 à 50 % de la dose suggérée) en présence de facteurs de risque chez l'usager : obésité personne âgée, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, etc.

Dose prescrite selon le poids de l'adulte ou de l'enfant supérieur ou égal à 30 kg

AGENTS SÉDATIFS		Prescrit	Admin.	Prescrit	Admin.	Prescrit	Admin.	Prescrit	Admin.	Prescrit	Admin.
Fentanyl (Sublimaze ^{mc}) 50 mcg/mL IV	Heure										
	Dose (mcg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/
Kétamine * (Kétalar ^{mc}) 50 mg/mL IV	Heure										
	Dose (mg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/
Midazolam (Versed ^{mc}) 1 mg/mL IV	Heure										
	Dose (mg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/
Propofol ** (Diprivan ^{mc}) 10 mg/mL IV	Heure										
	Dose (mg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/

* Associer le Midazolam (Versed^{mc}) à la Kétamine (Kétalar^{mc}) chez les usagers âgés de plus de 15 ans afin d'éviter un délirium d'émergence.

** Contre-indiqué si allergie aux œufs/soya.

AGENT POUR RENVERSER LES EFFETS DES BENZODIAZÉPINES EN CAS DE SURDOSAGE

Flumazénil (Anexate ^{mc}) 0.1 mg/mL IV	Heure										
	Dose (mg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/

AGENT POUR RENVERSER LES EFFETS DES OPIACÉS EN CAS DE SURDOSAGE

Naloxone (Narcan ^{mc}) 0.4 mg/mL IV ou IM	Heure										
	Dose (mg)										
	Volume (mL)										
	Initiales		/		/		/		/		/

Date : _____ Signature médecin : _____ Signature infirmière : _____ Init. : _____

Signature infirmière : _____ Init. : _____

AGENT	Dose initiale usuelle	Dose répétable usuelle	Début d'action (min)	Durée d'action (min)	Dosage en fonction du poids	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	
Fentanyl (Sublimaze ^{mc}) 50 mcg/mL IV	1 mcg/kg	1 mcg/kg	1-2	30-60	1 mcg/kg	mcg	30	40	50	60	70	80	90
						mL	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
Kétamine * (Kétalar ^{mc}) 50 mg/mL IV	0.5 à 1 mg/kg	0.5 mg/kg	1	10-20	0.25 mg/kg	mg	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5
						mL	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45
					0.5 mg/kg	mg	15	20	25	30	35	40	45
						mL	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
					1 mg/kg	mg	30	40	50	60	70	80	90
						mL	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8
Midazolam (Versed ^{mc}) 1 mg/mL IV	0.025 à 0.5 mg/kg	0.025 mg/kg	1-2	30-60	0.01 mg/kg	mg	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
						mL	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
					0.025 mg/kg	mg	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25
						mL	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25
					0.05 mg/kg	mg	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
						mL	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
Propofol ** (Diprivan ^{mc}) 10 mg/mL IV	0.5 mg/kg	0.25 à 0.5 mg/kg	1	5-10	0.25 mg/kg	mg	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5
						mL	0.75	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25
					0.5 mg/kg	mg	15	20	25	30	35	40	45
						mL	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
Flumazénil (Anexate ^{mc}) 0.1 mg/mL IV	0.2 mg	0.1 mg (dose max totale 1 mg)	1-3	30-60									
Naloxone (Narcan ^{mc}) 0.4 mg/mL IV ou IM	0.1 à 0.2 mg	0.1 à 0.2 mg (dose max totale 2 mg)	IV : 2 IM : 10-15	IV : 20-60 IM : 60-120									

* Associer le Midazolam (Versed^{mc}) à la Kétamine (Kétalar^{mc}) chez les usagers âgés de plus de 15 ans afin d'éviter un délirium d'émergence.

** Contre-indiqué si allergie aux œufs/soya.

Ce formulaire est inspiré du document « Sédation procédurale préévaluation médicale » de l'Hôtel-Dieu de Lévis, juillet 2011.

p:\directions\dsi\ordonnances ind\o.i. 26 ordonnance sédation procédurale à l'urgence.docx