

ORDONNANCE COLLECTIVE GMF

Code : DIG-02-CRQ

Date d'émission : juin 2013

Révisée le :

Référence à un protocole
de soins infirmiers

OUI NON

Objet : Initier dimenhydrinate (Gravol^{MC}) per os ou intra-rectal

Professionnels habilités

- Infirmières habilitées et ayant les connaissances du GMF ou CRQ

Secteur(s) d'activité(s) visé(s)

- GMF ou CRQ du CIUSSS

Clientèle, catégories de clientèles ou situation clinique visée

- Usager de plus de 2 ans présentant des nausées et/ou des vomissements.

Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'un usager symptomatique;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance;
- Appliquer des techniques invasives.

Indication / Conditions d'initiation

- Présence de nausées et/ou vomissements.

Intentions thérapeutiques

- Soulager les signes et symptômes de nausées et de vomissements.

Contre-indications / Limites / Référence au médecin

- Allergie au dimenhydrinate;
- Usager présentant somnolence ou dépression respiratoire;
- Douleur abdominale sévère;
- Douleur thoracique;
- Vomissement fécaloïde;
- Vomissement avec présence de sang;
- Chirurgie rectale récente;
- Femme enceinte au 1^{er} trimestre;
- Femme qui allaite;
- Nausées et/ou vomissements persistants au-delà de 24 heures.

Effets secondaires

- Somnolence;
- Étourdissements, vertiges, et sécheresse de la bouche;
- Excitabilité surtout chez les enfants.

Interaction médicamenteuse

- Anesthésiques, anticholinergiques, autres antiémétiques.
- Les effets secondaires sont potentialisés avec l'utilisation concomitante d'antihistaminiques, alcool et toute médication pouvant causer de la sédation (Barbituriques, benzodiazépines, narcotiques, relaxants musculaires, sédatifs, tranquillisants).



Alerte nursing

RECOMMANDER LA VIGILANCE LORS DE CONDUITE AUTOMOBILE PUISQUE LE MÉDICAMENT PEUT AMOINDRIR LES CAPACITÉS MENTALES

Directive / Références aux outils clinique

- Administrer dimenhydrinate selon le tableau:
" Dosage du dimenhydrinate oral ou rectal chez un usager > 2 ans selon le poids."

Tableau : Dosage du dimenhydrinate oral ou rectal chez un usager > 2 ans selon le poids

| POIDS (KG) | DOSE (MG) | COMPRIMÉ 50 MG/CO | SUPPOSITOIRE 25 MG – 50 MG – 100 MG |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 10,0 -19,9 kg | 12,5 mg q 6 h | ¼ de co | ½* sup de 25 mg |
| 20,0 - 27,9 kg | 25 mg q 6 h | ½ de co | 1 sup de 25 mg |
| 28,0 – 39,9 kg | 37,5 mg q 6 h | ¾ de co | 1 et ½* de 25 mg |
| 40 kg et plus, adultes | 50 à 100 mg q 4 à 6 h | 1 à 2 co | 1 sup de 50 mg Ou 1 sup de 100 mg |

* couper le suppositoire sur le sens de la longueur



Alerte nursing

UTILISER UNE DOSE DE 50 MG CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE DE PLUS 75 ANS : RISQUE DE CONFUSION ET/OU DE RÉTENTION URINAIRE.

NE PAS ADMINSTRER PAR VOIE INTRA-RECTALE CHEZ LES IMMUNOSUPPRIMÉS.

SI VOMISSEMENTS DANS LES 30 MINUTES QUI SUIVENT L'ADMINISTRATION PER OS, ON PEUT RÉPÉTER LA DOSE PAR VOIE INTRA-RECTALE (IR).

Dose maximale quotidienne pour un usager de 10,0 kg à 19,9 kg correspond à 75 mg / 24 h

Dose maximale quotidienne pour un usager de 20,0 kg à 39,9 kg correspond à 150 mg / 24 h

Dose maximale quotidienne pour un usager de 40 kg et plus, adultes correspond à 400 mg / 24 h

Médecins répondants

Médecin traitant ou le médecin de garde du **GMF** ou **CRQ**.

Sources

- Banque de Données Automatisée sur les Médicaments [BIAM]. (2000). Article récupéré le 06 janvier 2010 de <http://www.biam2.org/www/Sub93.html>
- Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (e-CPS). (2010). Graval^{MC}, préparation.
- Santé Canada. (2009). Norme d'étiquetage du dimenhydrinate. Article récupéré le 06 janvier 2010 de <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/label-etiquetpharm/dimenhyd-fra.php>
- Santé Ontario. (2009). Dimenhydrinate. Article récupéré le 06 janvier 2010 de http://www.santeontario.com/drugdetails.aspx?brand_id=1804&brand_name=dimenhydrinate
- Pediatric lexi-drugs online, visité le 6 janvier 2010.
- OC -22 Initier dimenhydrinate (Graval^{MC}) per os ou intra-rectal, CSSSQN, 2010

PROCESSUS D'ÉLABORATION :

Rédigé par :

Fabien Ferguson, conseiller en soins infirmiers 3 juin 2013

Personnes consultées :

| | |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| | Date |
| _____ | _____ |
| | Date |

Validé par :

| | |
|--------------------------|-------|
| _____ | _____ |
| Mme Sylvie Bonneau (DSI) | Date |

Approbation (La signature du médecin se retrouve sur original)

| Approbation médicale pour l'ordonnance collective <i>DIG-02-CRQ</i> Initier dimenhydrinate (Gravol ^{MC}) per os ou intra-rectal. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| NOM, prénom | NO DE PERMIS | SIGNATURE | DATE | TÉLÉPHONE |
| Bhérier Jean-Yves | 73343 | GMF Beauport | 2013-10-13 | 418-667-7114 |
| Jacob Renée | 76101 | GMF Beauport | 2013-10-17 | 418-667-7114 |
| Lefrançois Katleen | 86299 | GMF Beauport | 2013-10-21 | 418-667-7114 |
| Lefrançois Nil | 72224 | GMF Beauport | 2013-10-13 | 418-667-7114 |
| Lemelin Richard | 86300 | GMF Beauport | 2013-10-18 | 418-667-7114 |
| Martin Louise | 76368 | GMF Beauport | 2013-10-23 | 418-667-7114 |
| St-Aubin Diane | 87152 | GMF Beauport | 2013-10-24 | 418-667-7114 |
| Veilleux Sarto | 78284 | GMF Beauport | 2013-10-17 | 418-667-7114 |
| | | | | |