

ORDONNANCE COLLECTIVE

GMF

Code : ENDO-08-GMF

Date d'émission :
Révisée le : 21 juillet 2015,
22 janvier 2016

Référence à un protocole
de soins infirmiers

OUI NON

Objet : Ajustement de la dapagliflozine (Forxiga^{MD}) dans le diabète de type II

Professionnels habilités

- Les infirmières du GMF qui possèdent la formation pertinente, les connaissances et les compétences nécessaires à l'application de l'ordonnance collective.

Secteur(s) d'activité(s) visé(s)

- GMF

Clientèle, catégories de clientèles ou situation clinique visée

- Clientèle adulte ≥ 18 ans inscrite au GMF pour qui une médication du dapagliflozine (Forxiga^{MD}) a été initiée par le médecin ou chez qui un ajustement de la posologie est nécessaire.

Activités réservées

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Exercer une surveillance clinique de la condition de la personne dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
- Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
- Initier les mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

Indications / Conditions d'initiation

- Le médecin traitant complète le formulaire d'adhésion à l'ordonnance collective ;
- Diabète de type II ;
- Diabète non contrôlé ;
- HbA_{1C} cible non atteinte ;
- En monothérapie ;
- En association avec de la metformine ;
- En association avec une sulfonyleurée ;
- En association avec de l'insuline (seule ou avec la metformine) ;
- En association avec de la metformine et une sulfonyleurée (trithérapie) ;
- En association avec la sitagliptine (seule ou avec la metformine).

Intentions thérapeutiques

- Permettre un contrôle optimal et individualisé du diabète;
- Prévenir les complications liées à un mauvais contrôle du diabète.

Contre-indications

Absolues

- Hypersensibilité au médicament;
- DFGe (débit de filtration glomérulaire) < 60 ml/min/1,73 m².

Non-indiqués

- Femme enceinte, allaitement ;
- Diabète type I ;
- Avec la pioglitazone ;
- Cancer de la vessie évolutif.

Précautions

- Infections génitales fréquentes (vaginite, balanite);
- Patients à risque de déplétion volémique, d'hypotension et/ou de déséquilibre électrolytique ;
- 65 ans et plus.

Limites / Référence au médecin

- Lorsque la dose maximale de la médication est atteinte et que les valeurs cibles ne sont pas atteintes ;
- Présence d'effets indésirables de la médication ;
- Hypotension symptomatique;
- Hypoglycémie répétée et non améliorée après ajustement de l'insuline et sulfonylurée ;
- Diminution du DFG_e < 60 ml/min/1,73 m².

Effets secondaires


- Déplétion volémique et hypotension ;
- Mycoses génitales ;
- Infection des voies urinaires ;

Interactions médicamenteuses

- Aucun effet cliniquement pertinent
- Susceptible d'interagir :
 - Lithium

Directives / Références aux outils clinique

- Ajuste la posologie du dapagliflozine (Forxiga^{MD}) selon les directives d'ajustement afin d'atteindre les cibles fixées par le médecin;
- Calcule la clairance de la créatinine pour tous les clients avant le début du traitement (si le DFG_e n'est pas disponible);
- Prévoit les analyses de laboratoire suivantes avant le début du traitement avec la dapagliflozine : Hématocrite, ions, bilan lipidique et HbA_{1C} si plus de trois mois.
- Surveillance des hypoglycémies si prise d'insuline ou sulfonylurée; S'assurer, lors de l'initiation du traitement avec Forxiga et tout au long de la période d'ajustement, que la réduction des doses de sulfonylurée ou d'insuline a été considérée et demeure adéquate.
- Si prise de sulfonylurée ou d'insuline prévoir un suivi téléphonique pour l'évaluation de l'effet de la médication (hypoglycémie) une semaine après l'initiation du Forxiga ou selon la prescription médicale;
- À la quatrième semaine suivant l'initiation du Forxiga, l'infirmière planifie un rendez-vous avec le client pour le titrage à la médication.

 Il est conseillé de recommander aux patients prenant un inhibiteur de SGLT2 d'interrompre le traitement en cas de maladie telle que la grippe ou des maladies gastro-intestinales ou dans le cas d'une hospitalisation dû à une augmentation des risques de déshydratation et hypovolémie, ainsi que de surveiller leur prise de fluides d'une manière général et encore plus s'ils vont en vacances dans des pays chaud (toujours lié au risques accrus de déshydratation).

AJUSTEMENT DAPAGLIFLOZINE (FORXIGA^{MD})

DAPAGLIFLOZINE (FORXIGA^{MD})

Présentation et teneur	Dose maximale quotidienne
Comprimés de 5 mg (jaune) et 10 mg (blanc)	10 mg per os

Dose de départ	Titrage	Commentaires
□ 5 mg id	□ 10 mg id	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuster la médication suite à la rencontre de la 4^{ème} semaine, dose de 5mg bien tolérée ou selon prescription médicale; ▪ Surveiller glycémie.

Contre-indications	Effets secondaires	Notes
<p>Absolues</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hypersensibilité au médicament; ▪ DFGe (débit de filtration glomérulaire) < 60 ml/min/1,73 m². <p>Non-indiqués</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Femme enceinte, allaitement ; ▪ Diabète type I ; ▪ Avec la pioglitazone ; ▪ Cancer de la vessie évolutif. <p>Précautions</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infections génitales fréquentes (vaginite, balanite); ▪ Patients à risque de déplétion volémique, d'hypotension et/ou de déséquilibre électrolytique ; ▪ 65 ans et plus ; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Déplétion volémique et hypotension ; ▪ Mycoses génitales ; ▪ Infection des voies urinaires ; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si le patient oublie de prendre une dose de Forxiga, il doit le prendre dès qu'il constate son oubli. Toutefois, il ne faut pas doubler la dose de Forxiga au cours d'une même journée ; ▪ Prendre Forxiga le matin, permet la diminution de la nycturie ; ▪ Surveillance des hypoglycémies si prise d'insuline ou sulfonurée; ▪ En cas de gastro-entérite →cesser médication jusqu'à absence des symptômes. ▪ * Si signes ou symptômes acidose métabolique présents, aviser le médecin. <p>*Signes ou symptômes de l'acidose métabolique : nausée, vomissement, anorexie, douleur abdominale, grande soif, difficulté respiratoire, confusion, fatigue inexpliquée ou somnolence.</p>

Approbation (les signatures se retrouvent sur original)

Approbation médicale pour l'ordonnance collective				
ENDO-08-GMF Ajustement de la dapagliflozine (Forxiga^{MD}) dans le diabète de type II				
NOM, prénom	NO DE PERMIS	Lieu de pratique	DATE	TÉLÉPHONE
Auger François	85187	GMF Neufchâtel	2015-05-26	418-843-3771
Banville Christine	771591	GMF Val-Bélair	2015-04-20	418-843-2473
Beaulieu Hélène	86236	GMF Loretteville	2016-01-28	418-843-5141
Bélanger André	1840730	GMF Val-Bélair	2015-04-29	418-844-3721
Belle-Isle Jasmin	186340	GMF Val-Bélair	2015-04-15	418-843-2473
Berthelot Jacques	1832708	GMF Carrefour	2015-03-20	418-667-8066
Blouin Louis	1707109	GMF Loretteville	2015-11-19	418-842-3731
Blouin Patrick	80352	GMF Loretteville	2015-11-05	418-842-3731
Bouchard Christiane	1851955	GMF Carrefour	2015-03-20	418-667-8066
Boudreau Ghislain	1860477	GMF Loretteville	2015-11-15	418-842-3731
Breton Claude	181148	GMF Loretteville	2015-11-05	418-842-3731
Chouinard Claude	1823426	GMF Charlesbourg	2015-06-13	418-628-9921
Chouinard Guy	1813880	GMF Charlesbourg	2015-06-10	418-628-9921
Chouinard R. Hélène	105069	GMF Val-Bélair	2015-04-20	418-843-2473
Claude Sophie	96074	GMF Val-Bélair	2015-04-13	418-843-2473
Coté Guy	1733245	GMF Charlesbourg	2016-02-11	418-622-6969
Couture Clément	87392	GMF Carrefour	2015-04-12	418-667-8066
Darveau Stéphane	110617	GMF Neufchâtel	2015-05-25	418-843-3771
Dion Pierre	741834	GMF Neufchâtel	2015-05-05	418-843-3771
Dugas Christine	1921170	GMF Val-Bélair	2015-04-20	418-843-2473
Dupont Jacinthe	88292	GMF Nordet	2015-04-14	418-667-8066
Faber Anne	179201	GMF Loretteville	2015-11-05	418-842-3731
Fallu Bernard	88411	GMF Val-Bélair	2015-04-13	418-843-2473
Faucher Roland	1742816	GMF Loretteville	2016-01-29	418-843-5578
Fiset Serge	1752948	GMF Carrefour	2015-03-31	418-667-8066
Gagnon François	181409	GMF Val-Bélair	2015-04-20	418-843-2473
Grenier Julie	1070135	GMF Val-Bélair	2015-04-20	418-843-2473
Godin Paul-Émile	601186	GMF Carrefour	2015-03-27	418-667-8066
Houde Danielle	1901172	GMF Val-Bélair	2015-04-15	418-843-2473
Jacob, Renée	26-101	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114

Lafrance Gilles	1813476	GMF Charlesbourg	2015-06-13	418-628-9074
Lavoie-Ferland Hélène	1792076	GMF Carrefour	2015-03-20	418-667-8066
Lefrançois, Kathleen	86299	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Lefrançois, Nil	722241	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Lemelin, Richard	76-101	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Lemoine Lindsay	1722230	GMF Carrefour	2015-03-27	418-667-8066
Lessard Lucie	883255	GMF Val-Bélair	2015-04-13	418-843-2473
Martin, Louise	76368	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Mazur Sévérine	1034214	GMF Val-Bélair	2015-10-05	418-455-5340
Morency Pierre	1661206	GMF Charlesbourg	2015-06-08	418-628-9921
Ouellet Éric	773621	GMF Val-Bélair	2015-04-13	418-843-2473
Patry Claude	188236	GMF Loretteville	2015-11-05	418-842-3731
Proulx Simon-Pierre	178271	GMF Loretteville	2015-11-05	418-842-3731
Rhéaume Marie-Claude	1851542	GMF Charlesbourg	2015-06-05	418-628-9921
Rizzo Daniel	1901792	GMF Charlesbourg	2016-02-12	418-622-6969
Rochon Daniele	1854710	GMF Charlesbourg	2015-06-13	418-628-9074
Ross Julie	1843614	GMF Charlesbourg	2015-07-27	418-628-9074
Roy Yvon	1854207	GMF Carrefour	2015-04-14	418-667-8066
St-Aubin, Diane	87152	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Savard Anne	1773100	GMF Charlesbourg	2015-06-10	418-628-9921
Savoie Louis	1921469	GMF Carrefour	2015-04-14	418-667-8066
Tardif Alain	83329	GMF Neufchâtel	2015-05-05	418-843-3771
Tremblay Hélène	1803121	GMF Charlesbourg	2015-06-10	418-622-6969
Veilleux, Sarto	78284	GMF Beauport	2015-04-01	418-667-7114
Vézina Diane	1862291	GMF Carrefour	2015-03-20	418-667-8066

FORMULAIRE DE LIAISON POUR
LA TRANSMISSION DE L'INFIRMIERE
AU PHARMACIEN POUR L'APPLICATION DE L'OC
«Ajustement de la dapagliflozine (Forxiga^{MD})
dans le diabète de type II»

PARTIE À COMPLÉTER PAR L'INFIRMIÈRE

J'AI ÉVALUÉ LA PERSONNE CI-HAUT MENTIONNÉE CONCERNANT L'AJUSTEMENT DES HYPOGLYCÉMIANTS

EN RÉFÉRENCE À L'ORDONNANCE COLLECTIVE ENDO-08-GMF, AJUSTEMENT DE LA DAPAGLIFLOZINE (FORXIGA^{MD})

Dose actuelle : _____ Usager avisé du changement de posologie oui non

Dapagliflozine	
<input type="checkbox"/> Forxiga ^{MD}	
Dosage	Fréquence
mg	<input type="checkbox"/> ID

Cette ordonnance est valide pour 12 mois

Données pertinentes à l'ajustement de la médication

T.A : _____ DFGe _____ date _____

Nom de la pharmacie : _____

Numéro téléphone : _____ Numéro télécopieur : _____

Ce formulaire représente le formulaire original. Le pharmacien identifié est le seul destinataire. L'original de ce formulaire ne sera pas réutilisé.

Nom de l'infirmière: _____ No. Permis: _____

Téléphone: _____ Poste: _____ Télécopieur: _____

Signature de l'infirmière: _____ Date : _____

Nom du médecin signataire: _____ No. Permis: _____

Téléphone: _____ Poste: _____ Télécopieur: _____

Notes complémentaires : _____

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE PHARMACIEN

Nom du pharmacien : _____ No. Permis: _____






Produit servi : _____

Notes complémentaires : _____


Signature du pharmacien : _____ Date : _____

Pour visualiser l'ordonnance complète, rendez-vous dans le site Web, <http://www.ciuss-capitalnationale.gouv.qc.ca/>, section Expertise et partenariat/ OC GMF- CRQ (privés)

Mon patient rencontre-t-il les critères pour initier Forxiga^{MD} ?

INDICATIONS		PRECAUTIONS	
Diabète Type II		Diabète type I 	
Insuline		DFGe < 60 ml/min/1,73 m ² 	
Patient qui refuse prendre insuline		Enceinte ou prévoit de l'être 	
Gain pondéral avec insuline		Allaitement 	
DFGe ≥ 60 ml/min/1,73 m ²		Cancer de la vessie 	
Glycémies mal contrôlées		Infection génitale antérieure	
Hypertension		Symptômes déplétion volémique	
Hypoglycémies sous sulfonylurée			
Surpoids			

Ce questionnaire permet d'évaluer le patient par l'infirmière afin de déterminer s'il est un candidat à la dapagliflozine (Forxiga^{MD}), et le remet au médecin traitant.

SUIVI CLIENTÈLE

Créé par Fabien Ferguson conseiller clinique CSSS Québec-Nord, mars 2015