

PROTOCOLE MÉDICAL	Code : GMF-PRO-OSTEO-02 Date d'émission originale: 2020-12-02 Date de révision prévue : 2025-12-02	
	Référence à une ordonnance collective OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> GMF-OC-OSTEO-02 Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur	
Objet : Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur		
	Version antérieure	Dernière version
<u>Recommandé par</u> Médecins du GMF		2020-12
<u>Adopté par</u> Médecins signataires du GMF		2020-12

PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du GMF qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habilités et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

L'utilisateur ambulatoire de 18 ans et qui présente un traumatisme au membre supérieur (clavicule, épaule, humérus, coude, avant-bras, poignet, main ou doigt).

DIRECTIVES



Évaluation et démarches cliniques

1. Procéder à l'évaluation physique de l'utilisateur;
2. Documenter le contexte dans lequel est survenu le traumatisme;
3. Effectuer la comparaison du membre atteint avec celui qui est sain;
4. Déterminer la nécessité de recourir à une radiographie selon les critères suivants :
 - Histoire de traumatisme récent ou isolé (moins de 7 jours)

ET AU MOINS UN DES SYMPTÔMES SUIVANTS

- Œdème;
- Ecchymose;
- Déformation évidente.

GMF-PRO-OSTEO-02 Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur

Emplacement du traumatisme	Présence <u>d'au moins</u> un des critères suivants	
Clavicule	Avec douleur au niveau de l'os	
Épaule		
Humérus Coude		
Avant-bras	Avec douleur au niveau de l'os (Radius ou Cubitus)	
Poignet	Avec douleur au niveau de l'os Os du poignet (un des 8 os du Carpe)	

GMF-PRO-OSTEO-02 Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulateur présentant un traumatisme au membre supérieur

Emplacement du traumatisme	Présence <u>d'au moins</u> un des critères suivants	
Main	Avec douleur au niveau d'un des os de la main (un des 5 os du Métacarpe)	
Doigt	Avec douleur au niveau d'un des os des doigts (doigt : une des 3 Phalanges)	

5. Compléter la requête d'examen radiologique et la remettre à l'utilisateur;
6. Assurer le suivi requis :
 - o L'utilisateur devra aviser de son retour post radiologie au centre où a eu lieu sa consultation.
7. Documenter les interventions dans la note de soins.

PROCESSUS D'ÉLABORATION

Le processus d'élaboration s'appuie sur la triangulation de plusieurs sources de données, incluant des recommandations de bonnes pratiques cliniques, des données probantes, contextuelles et expérientielles.

Des protocoles médicaux, des guides de pratique clinique, des rapports de consensus publiés au courant des dix dernières années ont été recensés. Des documents provenant de l'agence réglementaire ou rédigés par des associations reconnues, organismes ou ordres professionnels ont également été consultés.

Le présent protocole est inspiré des normes de rédaction dictées par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

OUTILS DE RÉFÉRENCE ET SOURCES

Tiré du protocole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, **CIUSSSCN-PRO-2019-08** « Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur »

Jeffery Hale, Saint Brigid's (2014), Demander une radiographie osseuse. OC 2014-11-27-016

Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé, Initier une radiographie des membres suivants : clavicule, épaule, humérus, coude, avant-bras, poignet, main, doigt, fémur, jambe et orteil. (2003)

Centre de santé et de services sociaux du Granit, demander une radiographie d'un membre supérieur (humérus, coude, avant-bras, poignet, main, doigt).OC-0044

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie du coude. (2014)

Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, Demander une radiographie des doigts, de la main, du poignet, de l'avant-bras, des orteils ou de la jambe (exclusion : coude, genou, cheville et pied) (2014)

GMF-PRO-OSTEO-02 Initier une mesure diagnostique de radiologie (radiographie de la clavicule, de l'épaule, de l'humérus, du coude, de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du doigt) chez l'utilisateur ambulatoire présentant un traumatisme au membre supérieur

