

## INFORMATIONS SUR LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES CHEZ UN HOMME PRÉSENTANT UN ÉCOULEMENT URÉTRAL

Les informations sur les traitements pharmacologiques présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.

### AZITHROMYCINE

**Contre-indications :**

- Antécédent de réaction allergique aux macrolides (p. ex. azithromycine, clarithromycine, érythromycine)
- Antécédent d'ictère cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique associé à l'utilisation antérieure d'azithromycine

**Précautions :**

- Insuffisance hépatique sévère
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine <10 ml/min)
- Myasthénie grave
- Prolongation congénitale ou acquise de l'intervalle QT

**Effets indésirables :**

- Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements

**Interactions médicamenteuses :**

- Médicaments qui prolongent l'intervalle QT (p.ex. : amiodarone, citalopram, dompéridone, halopéridol, sotalol)
- Médicaments substrats de la glycoprotéine P / ABCB1 (p.ex. : colchicine, digoxine, dabigatran)

### CÉFIXIME – CEFTRIAXONE

**Contre-indications :**

- Antécédent de réaction allergique aux céphalosporines

**Précautions :**

- Antécédent de réaction allergique aux pénicillines (p. ex. pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline)

**Effets indésirables :**

- Effets gastro-intestinaux : diarrhées, nausées
- Inconfort au site d'injection (ceftriaxone)

**Interactions médicamenteuses :**

- Aucune interaction significative (dose unique)

**Diluant à privilégier pour la ceftriaxone :**

Lidocaïne 1% sans épinéphrine (utiliser la lidocaïne 1% sans épinéphrine seulement si aucun antécédent de réaction allergique à la lidocaïne ou à une autre anesthésiant local)

## DOXYCYCLINE

**Contre-indications :**

- Antécédent de réaction allergique aux tétracyclines (p. ex. doxycycline, minocycline, tétracycline, tigécycline)
- Myasthénie grave

**Précautions :**

- Anomalie de l'œsophage (p.ex. sténose, achalasie)

**Effets indésirables :**

- Photosensibilité
- Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements
- Irritation œsophagienne

**Interactions médicamenteuses :**

- Antagoniste de la vitamine K (p.ex. warfarine) – *un suivi du RNI 4 à 5 jours après le début du traitement est recommandé*
- Antiacides, sous-salicylate de bismuth ou multivitamines (calcium, fer, magnésium)
- Anticonvulsivants (p.ex. barbituriques, carbamazépine, phénytoïne)
- Classe des rétinoïdes (p. ex. acitrétine, isotrétinoïne)

## GENTAMICINE

**Contre-indications :**

- Antécédent de réaction allergique aux aminoglycosides (p. ex. amikacine, gentamicine, streptomycine, tobramycine)

**Précautions :**

- Le volume maximal pour une injection intramusculaire étant de 3 ml par injection, la gentamicine ne devrait pas être diluée avec de la lidocaïne 1% sans épinéphrine.

**Effets indésirables :**

- Inconfort au site d'injection

**Interactions médicamenteuses :**

- Aucune interaction significative (dose unique)