

Les informations sur les traitements pharmacologiques présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.

AZITHROMYCINE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux macrolides (p. ex. azithromycine, clarithromycine, érythromycine)
- ▶ Antécédent d'ictère cholestatique ou de dysfonctionnement hépatique associé à l'utilisation antérieure d'azithromycine

Précautions :

- ▶ Insuffisance hépatique sévère
- ▶ Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 10 mL/min)
- ▶ Myasthénie grave
- ▶ Prolongation congénitale ou acquise de l'intervalle QT

Effets indésirables :

- ▶ Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Médicaments qui prolongent l'intervalle QT (p. ex. : amiodarone, citalopram, dompéridone, halopéridol, sotalol)
- ▶ Médicaments substrats de la glycoprotéine P / ABCB1 (p.ex. : colchicine, digoxine, dabigatran)

CÉFIXIME - CEFTRIAZONE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux céphalosporines

Précautions :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux pénicillines (p. ex. pénicilline G ou V, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, pipéracilline)

Effets indésirables :

- ▶ Effets gastro-intestinaux : diarrhées, nausées
- ▶ Inconfort au site d'injection (ceftriaxone)

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Aucune interaction significative (dose unique)

Diluant à privilégier pour la ceftriaxone :

- ▶ Lidocaïne 1% sans épinéphrine (utiliser la lidocaïne 1% sans épinéphrine seulement si aucun antécédent de réaction allergique à la lidocaïne ou à un autre anesthésiant local)

CLINDAMYCINE (CRÈME VAGINALE)

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique à la clindamycine

Précautions :

- ▶ L'efficacité de certaines méthodes contraceptives (condom de latex, diaphragme et cape cervicale en latex, spermicide) peut être compromise durant le traitement.

Effets indésirables :

- ▶ Aucun effet indésirable significatif

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Aucune interaction significative

CLOTRIMAZOLE – MICONAZOLE - TERCONAZOLE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux antifongiques azolés topiques

Précautions :

- ▶ L'efficacité de certaines méthodes contraceptives (condom latex, diaphragme et cape cervicale en latex, spermicide) peut être compromise durant le traitement.

Effets indésirables :

- ▶ Sensation de brûlure
- ▶ Irritation cutanée (les formulations de plus courte durée causent plus d'irritation cutanée)

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Aucune interaction significative

DOXYCYCLINE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux tétracyclines (p. ex. doxycycline, minocycline, tétracycline, tigécycline)
- ▶ Grossesse
- ▶ Myasthénie grave

Précautions :

- ▶ Anomalie de l'oesophage (p.ex. sténose, achalasie)

Effets indésirables :

- ▶ Photosensibilité
- ▶ Effets gastro-intestinaux : diarrhées, douleurs abdominales, nausées, vomissements
- ▶ Irritation oesophagienne

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Antagoniste de la vitamine K (p.ex. warfarine) – *un suivi du RNI 4 à 5 jours après le début du traitement est recommandé*
- ▶ Antiacides, sous-salicylate de bismuth ou multivitamines (calcium, fer, magnésium)
- ▶ Anticonvulsivants (p.ex. barbituriques, carbamazépine, phénytoïne)
- ▶ Classe des rétinoïdes (p. ex. acitrétine, isotrétinoïne)

FLUCONAZOLE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique au fluconazole ou à un autre antifongique azolé

Précautions :

- ▶ Prolongation congénitale ou acquise de l'intervalle QT
- ▶ Insuffisance hépatique sévère

Effets indésirables :

- ▶ Nausées
- ▶ Douleurs abdominales
- ▶ Céphalées

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Aucune interaction significative (dose unique)

GENTAMICINE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique aux aminoglycosides (p. ex. amikacine, gentamicine, streptomycine, tobramycine)

Précautions :

- ▶ Le volume maximal pour une injection intramusculaire étant de 3 mL par injection, la gentamicine ne devrait pas être diluée avec de la lidocaïne 1 % sans épinéphrine.

Effets indésirables :

- ▶ Inconfort au site d'injection

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Aucune interaction significative (dose unique)

MÉTRONIDAZOLE

Contre-indications :

- ▶ Antécédent de réaction allergique au métronidazole

Précautions :

- ▶ Dyscrasies sanguines
- ▶ Insuffisance hépatique sévère
- ▶ Maladies évolutives ou chroniques graves affectant le système nerveux central

Éviter la consommation d'alcool pendant le traitement et au moins 24 heures après la fin du traitement (effet disulfiram) : métronidazole PO ou gel

Effets indésirables :

- ▶ Nausées
- ▶ Goût métallique
- ▶ Étourdissements
- ▶ Céphalées
- ▶ Coloration foncée de l'urine
- ▶ Diarrhée

Interactions médicamenteuses :

- ▶ Anticonvulsivants (p. ex. phénobarbital, phénytoïne)
- ▶ Antagoniste de la vitamine K (p.ex. warfarine) – *un suivi du RNI 4 à 5 jours après le début du traitement est recommandé*

** Les concentrations sériques de métronidazole à la suite de l'administration du gel intravaginal sont faibles. Les caractéristiques listées ici concernent donc surtout la forme orale.*