


***** NOTE: L'infirmière qui décide d'utiliser cet algorithme doit posséder les connaissances et habiletés requises pour assurer la qualité et la sécurité du soin à l'utilisateur. Dans le doute, l'appel au médecin est essentiel avant son utilisation**

HAMEL

ALGORITHME DE LA DYSRÉFLEXIE / HYPERRÉFLEXIE AUTONOME

POUR METTRE EN BRANLE L'ALGORITHME DE DYSRÉFLEXIE/HYPERRÉFLEXIE, S'ASSURER QUE LE PATIENT REMPLIT LES 3 CONDITIONS AU VERSO

*** Si l'introduction de la sonde est difficile. Utiliser Gel xylocaïne (Lidocaïne) selon O.C.
Un autre intervenant peut faire un toucher rectal en même temps.
 N.B. Sonde coudée disponible au KA, si nécessaire



Pour mettre en branle l'algorithme de dysrèflexie/hyperrèflexie, les **3 conditions suivantes** doivent toutes être remplies:

1. **Lésion médullaire complète ou partielle située à D6 ou au-dessus**

ET

2. **Hypertension artérielle (HTA):**

- HTA relative: augmentation d'au moins 20 mmHg de systolique (adulte) (ou 15 mmHg ado 13-17 ans) par rapport aux TA habituelles
- ou
- HTA absolue: TA plus de 150 mmHg de systolique (adulte) (ou 140 mmHg ado 13-17 ans)

ET

3. **Au moins un des symptômes de dysrèflexie ci-dessous:**

Symptômes de dysrèflexie

- Bradycardie, tachycardie ou arythmie
- Céphalée importante
- Spasticité accrue
- Sudation ou flushing au-dessus du niveau lésionnel
- Pâleur et froideur en dessous du niveau lésionnel
- Vision embrouillée
- Atteinte système nerveux central (convulsion, somnolence, hémiparésie)
- Anxiété
- Piloérection (chair de poule)/frisson

Informations sur les causes de dysrèflexie

- 85 % des cas: distension vésicale (globe) ou impaction rectale (fécalome)
- Sinon:
 - Infections urinaires, pierres vésicales
 - Hémorroïdes, lithiases vésiculaire, appendicite, ulcères gastriques
 - Plaie, ongle incarné, piqûre d'insecte
 - Relations sexuelles, MTS
 - Menstruations, grossesse, accouchement, vaginite
 - Épididymite, compression scrotale, électroéjaculation, stimulation par vibration
 - Traumatisme, embolie pulmonaire, thrombophlébite, ossification hétérotopique, abus de substance (alcool, drogues, stimulants), procédures diagnostiques, chirurgie, stimulation électrique fonctionnelle.