

## ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

<b>OBJET :</b> Ouvrir une veine et la garder ouverte au moyen d'un soluté de chlorure de sodium 0,9% (NaCl 0,9 %, normal salin)	<b>EN VIGUEUR :</b> 2012-02-07
<b>INDICATION :</b> Ouvrir une veine	<b>RÉVISÉ :</b> 2014-10-24
<b>CLIENTÈLE :</b> <u>admise et inscrite</u> enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences	<b>APPROUVÉE PAR :</b> D <sup>re</sup> Caroline Bédard, présidente du CMDP Suzanne Chayer, chef du département de pharmacie
<b>RESTRICTION :</b> NIL	<b>Professionnels autorisés :</b> <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>						
Ouvrir une veine et la garder ouverte par un soluté.	Installer un cathéter et administrer un soluté de chlorure de sodium 0,9% (NaCl 0,9%, normal salin) : <table border="1" data-bbox="643 1144 1042 1377"> <thead> <tr> <th>Poids de l'utilisateur (kg)</th> <th>Débit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moins de 50</td> <td>15 ml/h</td> </tr> <tr> <td>50 et plus</td> <td>30 ml/h</td> </tr> </tbody> </table>	Poids de l'utilisateur (kg)	Débit	Moins de 50	15 ml/h	50 et plus	30 ml/h	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulter les <b>Méthodes de soins infirmiers</b> (Intranet, onglet Vie clinique – veine périphérique)</li> <li>• Aviser le médecin (ex. : ajustement du débit).</li> </ul>
Poids de l'utilisateur (kg)	Débit							
Moins de 50	15 ml/h							
50 et plus	30 ml/h							