

OC-IRDPQ-PH-03

## ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

<b>OBJET :</b> Administration de <b>CHLORURE DE SODIUM (SALINEX)</b> en vaporisation nasale	<b>EN VIGUEUR :</b> 1999-11-02
<b>INDICATION :</b> Congestion nasale isolée ou sécheresse des muqueuses nasales	<b>RÉVISÉ :</b> 2014-10-24
<b>CLIENTÈLE :</b> <u>admise</u> : enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences	<b>APPROUVÉE PAR :</b> Dre Caroline Bédard, présidente du CMDP Suzanne Chayer, chef du département de pharmacie
<b>RESTRICTION :</b> NIL	<b>Professionnels autorisés :</b> <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
<p>Congestion nasale isolée ou sécheresse des muqueuses nasales.</p>	<p>Chlorure de sodium 0,9% (<i>Salinex</i>) en vaporisation nasale</p> <p>1 à 2 vaporisations dans les narines, 3 à 4 fois dans les 24 heures.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Évaluer la qualité et la quantité d'exsudat.</li> </ul> <p>Méthode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Idéalement, moucher le nez avant.</li> <li>▪ Pencher la tête vers l'avant et incliner vers la narine opposée.</li> <li>▪ Placer l'embout dans la narine (&lt; ¼ pouce) et presser.</li> <li>▪ Moucher.</li> <li>▪ Durée maximale d'utilisation ⇒ 24 heures. Si problématique non résolue ou détérioration de l'état (ex. : fièvre ou sécrétions colorées), aviser le médecin</li> </ul>