

OC-IRD PQ-PH-05

ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

OBJET : Ouvrir une veine et la maintenir ouverte au moyen d'un soluté glucosé (dextrose, DW) 10 % dans l'eau	EN VIGUEUR : octobre 2006
INDICATION : Hypoglycémie chez l'adulte (glycémie < 4 et inconscient ou incapable d'aval)	RÉVISÉ : 16 octobre 2012
CLIENTÈLE : <u>admise</u> : adultes/aînés, toutes déficiences	APPROUVÉE PAR : Dre Mélanie Laberge, présidente du CMDP Éric Lepage, chef du département de pharmacie par intérim
RESTRICTION : NIL	Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Usager présentant une glycémie inférieure à 4 mmol/L, inconscient ou incapable d'aval (selon l'algorithme des interventions lors d'hypoglycémie).	Soluté DW 10 % dans l'eau (dextrose)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ouvrir une veine. ▪ Consulter la technique de soins dans les Méthodes de soins infirmiers (Intranet, onglet Vie clinique – veine périphérique) ▪ Débit 100 cc/heure ▪ Aviser le médecin.