

## ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

<b>OBJET</b> : Administration de <b>DIMENHYDRINATE</b> (Gravol)	<b>EN VIGUEUR</b> : 2004-10-12
<b>INDICATION</b> : Nausées, vomissements	<b>RÉVISÉ</b> : 2014-10-24
<b>CLIENTÈLE</b> : <u>admise</u> : enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences	<b>APPROUVÉE PAR</b> : Dre Caroline Bédard, présidente du CMDP  Suzanne Chayer, chef du département de pharmacie
<b>RESTRICTION</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ fièvre</li> <li>▶ enfants &lt; 2 ans ou poids &lt; 12 kg</li> <li>▶ signes d'occlusion intestinale (ballonnement abdominal, absence de selles depuis &gt; 7 jours)</li> <li>▶ douleur abdominale intense</li> <li>▶ rectorragies (si suppositoires seulement)</li> <li>▶ glaucome à angle fermé, hypertrophie bénigne de la prostate, rétention urinaire</li> <li>▶ hypersensibilité au dimenhydrinate ou à toute autre composante du produit.</li> </ul>	<b>Professionnels autorisés :</b> <i><b>infirmières, infirmiers</b></i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées</li> <li>• Vomissements</li> </ul>	<p><b><u>Posologie chez l'adulte</u></b> :</p> <p>1 comprimé de 50 mg ou 1 suppositoire de 50 mg</p> <p><b><u>Posologie chez l'enfant</u></b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 à 20 kg : <u>15 mg</u> en comprimé ou <u>25 mg</u> en suppositoire</li> <li>• 21 à 30 kg : <u>25 mg</u> en comprimé ou <u>25 mg</u> en suppositoire</li> <li>• &gt; 30 kg : <u>50 mg</u> en comprimé ou <u>50 mg</u> en suppositoire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VALIDE POUR UNE SEULE DOSE.</b> Si non soulagé après la dose, avvertir le médecin.</li> <li>• Attention : effet additif avec alcool et autres déprimeurs du SNC (voir la grille de <i>Surveillance clinique d'un usager admis recevant un opiacé</i>).</li> </ul>