

ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

OBJET : Administration de DIPHENHYDRAMINE (Benadryl)	EN VIGUEUR : 2011-04-26
INDICATION : choc anaphylactique (voir algorithme en vigueur)	RÉVISÉ : 2013-02-12
CLIENTÈLE : <u>admise et inscrite</u> enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences	APPROUVÉE PAR : D ^{re} Mélanie Laberge, présidente du CMDP Éric Lepage, chef du département de pharmacie
RESTRICTION : Hypersensibilité à la diphenhydramine ou à toute autre composante du produit	Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Choc anaphylactique	<p>Diphenhydramine solution injectable 50 mg/ml</p> <p><u>Dose chez l'adulte (i.v. ou i.m):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 mg (1 ml) <p><u>Dose chez l'enfant (i.v.ou i.m.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 kg : 5 mg (0,10 ml) ▪ 4 kg : 6 mg (0,12 ml) ▪ 5 kg : 8 mg (0,16 ml) ▪ 6 kg : 10 mg (0,20 ml) ▪ 7 kg : 11 mg (0,22 ml) ▪ 8 kg : 12 mg (0,24 ml) ▪ 9 kg : 14 mg (0,28 ml) ▪ 10-12.9 kg : 17 mg (0,34 ml) ▪ 13-14.9 kg : 21 mg (0,42 ml) ▪ 15-19.9 kg : 25 mg (0,5 ml) ▪ 20-29.9 kg : 35 mg (0,7 ml) ▪ 30-34.9 kg : 40 mg (0,8 ml) ▪ ≥ 35 kg : 50 mg (1 ml) <p>Administration d'une seule dose par voie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i.v. (vitesse d'administration maximale : 25 mg/minute, exemple : 50 mg en 2 minutes ou plus) ou ▪ i.m. si voie intraveineuse impossible 	