

OC-IRDPQ-PH-13

ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

| | | |
|-----------------------|--|--|
| OBJET : | Application de LIDOCAINE gel 2% (XYLOCAÏNE) | EN VIGUEUR : 2013-01-15 |
| INDICATIONS : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Douleur anale lors des soins intestinaux 2. Cathétérisme vésical techniquement difficile 3. Chez les blessés médullaires avec risque ou présence de dysréflexie autonome pour éviter l'augmentation de pression | RÉVISÉ : 2014-04-10 |
| CLIENTÈLE : | admise ou inscrite enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences. | APPROUVÉE PAR : Dre Caroline Bédard, présidente du CMDP Dr Benoît Dumais, chef du département de pharmacie par intérim |
| RESTRICTIONS : | <p>Hypersensibilité à la lidocaïne (<i>Xylocaïne</i>) ou toute autre composante du produit.</p> <p>Anticoagulothérapie lors d'un curage rectal seulement (sauf pour les blessés médullaires dont l'élimination intestinale se réalise par curage rectal)</p> | Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers</i> |

| <u>Situations cliniques</u> | <u>Médication</u> | <u>Intervention</u> |
|--|--|---------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Douleur anale lors des soins intestinaux 2. Cathétérisme vésical techniquement difficile 3. Chez les blessés médullaires avec risque ou présence de dysréflexie autonome pour éviter l'augmentation de pression | <p>Lidocaïne - <i>Xylocaïne</i> 2 % gel</p> <p>En application locale 10 minutes avant la procédure (sauf en cas de dysréflexie autonome, aucune attente)</p> <p>Adulte : maximum 20 ml si application rectale</p> <p>Enfant : Maximum 3 ml/10 kg de poids si application rectale (maximum 20 ml)</p> | |