



ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION		
OBJET :	Administration de NITROGLYCÉRINE en onguent (Nitrol)	EN VIGUEUR : 2014-02-13
INDICATION :	Dysrèflexie/hyperrèflexie autonome (selon algorithme)	RÉVISÉ : 2014-02-28
CLIENTÈLE :	Tous les blessés médullaires dont l'âge est ≥ 13 ans (boul. Hamel) admis ou inscrits	APPROUVÉE PAR : Dre Nancy-Michelle Robitaille, présidente par intérim du CMDP Dr Benoit Dumais, chef par intérim du département de pharmacie
CONTRE-INDICATIONS :	<ul style="list-style-type: none"> Hypersensibilité à la nitroglycérine ou à toute autre composante du produit. Prise des inhibiteurs de la phosphodièstérase (PDE₅) courte action dans les 24 heures précédentes. Prise des inhibiteurs de la phosphodièstérase (PDE₅) longue action dans les 7 jours précédents. 	Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers travaillant avec les blessés médullaires</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Dysrèflexie/hyperrèflexie autonome 	Nitroglycérine en onguent 2 % (Nitrol) <ul style="list-style-type: none"> Mettre 1 pouce (2,5 cm) d'onguent sur le papier <i>Appli-Ruler</i> (fourni dans la boîte de Nitrol), côté imprimé en-dessous, pour une application seulement Appliquer avec une légère pression le côté enduit d'onguent sur la peau propre, sèche et sans poils, <u>au-dessus du niveau de la lésion de la moelle épinière</u>  Voir illustration ci-contre Ne pas faire pénétrer, ne pas frictionner 	<ul style="list-style-type: none"> Monitorer TA selon l'algorithme en vigueur Dès que les TA habituelles de l'utilisateur sont atteintes, retirer le papier applicateur et essuyer sans étendre l'onguent

LISTE DES INHIBITEURS DE LA PHOSPHODIESTÉRASE 5 (PDE₅)

Noms génériques	Noms commerciaux	Durée d'action
Sildenafil	Viagra, Revatio	courte
Tadalafil	Cialis, Adcirca	longue
Vardenafil	Levitra	courte