

ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

<p>OBJET : Administration de NITROGLYCÉRINE (NITROLINGUAL)</p> <p>INDICATION : Douleur rétrosternale (voir algorithme)</p> <p>CLIENTÈLE : <u>admise et inscrite</u> : adultes/aînés, toutes déficiences (boul. Hamel seulement)</p> <p>RESTRICTION :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hypersensibilité à la nitroglycérine ou à toute autre composante du produit; • Prise de PDE₅ (Levitra, Viagra, Revatio) dans les 24 heures précédentes ⇒ si donnée non disponible, administrer nitroglycérine; • prise de PDE₅ (Cialis) dans les 48 heures précédentes ⇒ si donnée non disponible, administrer nitroglycérine. 	<p>EN VIGUEUR : 2000-05-16</p> <p>RÉVISÉ : 16 octobre 2012</p> <p>APPROUVÉE PAR : D^{re} Mélanie Laberge, présidente du CMDP Éric Lepage, chef du département de pharmacie</p> <p>Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers</i></p>
--	--

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Douleur rétrosternale se présentant par exemple sous forme de serrement, brûlure et pesanteur.	<p><u>Nitroglycérine 0,4 mg pompe :</u> 1 vaporisation sous ou sur la langue « STAT ».</p> <p>Ne pas agiter la bouteille. Amorcer la pompe en actionnant le pulvérisateur 5 fois dans les airs avant administration.</p> <p>Tenir à la verticale durant l'administration.</p> <p>Ne pas rincer la bouche dans les prochaines 5-10 minutes.</p> <p><u>Si non soulagé après la première dose :</u> répéter aux 5 minutes pour un maximum de 3 doses au total.</p>	