

## ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

<b>OBJET :</b> Administration d' <b>ACÉTAMINOPHÈNE</b> ( <i>Tylenol, Atasol, Abenol, Tempra</i> )	<b>EN VIGUEUR :</b> 1998-05-12 2014-02-13
<b>INDICATION :</b> Fièvre <b>ou</b> douleur	<b>RÉVISÉ :</b> 2014-02-07
<b>CLIENTÈLE :</b> <u>admise</u> : enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences <u>inscrite</u> : enfants/adolescents seulement	<b>APPROUVÉE PAR :</b> D <sup>re</sup> Nancy-Michelle Robitaille, présidente du CMDP par intérim  Dr Benoit Dumais, chef du département de pharmacie par intérim
<b>RESTRICTIONS :</b> Douleurs abdominales, crampes, nausées, vomissements, saignements rectaux; hypersensibilité à l'acétaminophène ou à toute autre composante du produit.	<b>Professionnels autorisés :</b> <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Température supérieure à 38,5°C rectale (voie privilégiée) ou 38,0°C buccale  ou  Douleurs	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>Si poids ≥ 43,3 kg</b></p> <p>2 co 325 mg aux 4 heures au besoin.</p> <p>Si voie orale inutilisable : 1 suppositoire 650 mg IR aux 4 heures au besoin.</p> <p>Max : 4000 mg /24h*.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Si poids ≤ 43,2kg</b></p> <p>Per os : gouttes, sirop ou comprimés aux 4 heures au besoin → voir tableau des doses ci-joint.</p> <p>Si voie orale inutilisable : suppositoire IR aux 4 heures au besoin → voir tableau des doses ci-joint.</p> <p>Max : 5 doses/24h*.</p> </div> <p style="font-size: small;">* incluant les autres produits contenant de l'acétaminophène. (ex. : <i>Tramacet</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ École Madeleine-Bergeron : aviser les parents.</li>   <li>▪ Durée maximale de l'OC : 24 heures.</li> </ul>

**Vigilance :** **L'utilisateur blessé médullaire** : éliminer le syndrome de dysrèflexie autonome et l'infection urinaire.  
**L'utilisateur diabétique** : vérifier la glycémie.  
**DRS**

**DOSES D'ACÉTAMINOPHÈNE SI POIDS ≤ 43,2 KG**

(OC-IRDPQ-PH-01)

<b>Poids (kg)</b>	<b>Dose (mg)</b>	<b>Poids (kg)</b>	<b>Dose (mg)</b>
2,7 à 5,3	40	16,4 à 21,7	240
5,4 à 8,1	80	21,8 à 27,2	320
8,2 à 10,8	120	29,3 à 32,6	400
10,9 à 16,3	160	32,7 à 43,2	480