

**ORDONNANCE COLLECTIVE D’INITIATION D’UNE MÉDICATION**

<b>OBJET :</b> Administration d’antiacides <b>HYDROXYDE D’ALUMINIUM/MAGNÉSIUM</b> (Maalox, Almagel)	<b>EN VIGUEUR :</b> 2004-10-12 <b>2014-02-13</b>
<b>INDICATION :</b> Dyspepsie fonctionnelle	<b>RÉVISÉ :</b> 2014-02-07
<b>CLIENTÈLE :</b> <u>admise</u> enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences.	<b>APPROUVÉE PAR :</b>  D <sup>re</sup> Nancy-Michelle Robitaille, présidente du CMDP par intérim  Dr Benoit Dumais, chef du département de pharmacie par intérim
<b>RESTRICTIONS :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuffisance rénale sévère (Clcr &lt; 30ml/min)</li> <li>• Enfants &lt; 3 ans</li> <li>• Hypersensibilité à l’hydroxyde d’aluminium ou de magnésium ou à toute autre composante du produit.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Professionnels autorisés :</b> <b>infirmières, infirmiers</b></p>

<u>Situation clinique</u>	<u>Médication</u>	<u>Intervention</u>
Brûlure/douleur épigastrique  OU  Brûlure rétrosternale (pyrosis)  OU  Impression de plénitude après un repas  OU  Satiété rapide	<u>Posologie :</u>  3 à 11 ans : 10 ml  ≥ 12 ans : 15 ml  <u>Dyspepsie connue :</u> Si problématique non résolue ou détérioration, aviser le médecin.  Si soulagement initial mais réapparition des symptômes, la dose peut être répétée après 6 heures (maximum de 3 doses au total).  <u>Dyspepsie de novo :</u> Non répétable et aviser médecin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien agiter.</li> <li>• S’assurer, autant que possible, d’être 2 heures avant ou 2 heures après la prise de toute médication.</li> </ul>