

ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

OBJET : Administration de naloxone (Narcan)	EN VIGUEUR : 2000-05-16 2014-02-13
INDICATION : dépression respiratoire induite par l'utilisation d'un opiacé (voir algorithme en vigueur).	RÉVISÉ : 2013-12-06
CLIENTÈLE : <u>admise ou inscrite</u> enfants/adolescents/adultes/aînés,	APPROUVÉE PAR : D ^{re} Nancy-Michelle Robitaille, présidente du CMDP par intérim Dr Benoit Dumais, chef du département de pharmacie par intérim
RESTRICTION : NIL	Professionnels autorisés : <i>infirmières, infirmiers</i>

<u>Situations cliniques</u>	<u>Médication</u>																											
<p>A</p> <p>Enfants et adolescents</p>	<p>Naloxone 1mg/ml solution injectable</p> <p>0,01 mg/kg (max : 0,1 mg/dose) IV* aux 2 minutes jusqu'à <u>dose cumulative maximale : 1mg</u> ou jusqu'à FR adéquate :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-11 mois : 20/min et + • 1-2 ans : 16/min et + • 3-7 ans : 14/min et + • 8-17 ans : 10/min et + <p>* Si voie IV non disponible, utiliser voie SC jusqu'à ce qu'une veine soit ouverte (voir OC chlorure de sodium 0,9% IV gvo).</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Poids (kg)</th> <th>Dose (mg)</th> <th>Dose (ml)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3</td><td>0,03</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,04</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>5</td><td>0,05</td><td>0,05</td></tr> <tr><td>6</td><td>0,06</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>7</td><td>0,07</td><td>0,07</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,08</td><td>0,08</td></tr> <tr><td>9</td><td>0,09</td><td>0,09</td></tr> <tr><td>10 et +</td><td>0,10</td><td>0,10</td></tr> </tbody> </table>	Poids (kg)	Dose (mg)	Dose (ml)	3	0,03	0,03	4	0,04	0,04	5	0,05	0,05	6	0,06	0,06	7	0,07	0,07	8	0,08	0,08	9	0,09	0,09	10 et +	0,10	0,10
Poids (kg)	Dose (mg)	Dose (ml)																										
3	0,03	0,03																										
4	0,04	0,04																										
5	0,05	0,05																										
6	0,06	0,06																										
7	0,07	0,07																										
8	0,08	0,08																										
9	0,09	0,09																										
10 et +	0,10	0,10																										

B

Enfants et adolescents

Naloxone 1mg/ml solution injectable

0,1 mg/kg (max : 2 mg/dose) **IV*** aux 2 minutes
jusqu'à dose cumulative maximale : 10mg ou jusqu'à FR
adéquate :

- 6-11 mois : 20/min et +
- 1-2 ans : 16/min et +
- 3-7 ans : 14/min et +
- 8-17 ans : 10/min et +

* Si voie IV non disponible, utiliser voie SC jusqu'à ce qu'une
veine soit ouverte (voir OC chlorure de sodium 0,9% IV gvo).

Poids (kg)	Dose (mg)	Dose (ml)
3	0,3	0,3
4	0,4	0,4
5	0,5	0,5
6	0,6	0,6
7	0,7	0,7
8	0,8	0,8
9	0,9	0,9
10	1,0	1,0
11	1,1	1,1
12	1,2	1,2
13	1,3	1,3
14	1,4	1,4
15	1,5	1,5
16	1,6	1,6
17	1,7	1,7
18	1,8	1,8
19	1,9	1,9
20 et +	2,0	2,0

C

Adultes et personnes âgées

Naloxone 1mg/ml solution injectable

0,1 mg (0,1 ml) **IV***



Si la FR ≤ 7/min après 2 minutes,
naloxone 0,2 mg (0,2 ml) **IV***



Si la FR ≤ 7/min après 2 autres minutes,
naloxone 0,3 mg (0,3 ml) **IV***



Si la FR ≤ 7/min après 2 autres minutes,
naloxone 0,4 mg (0,4 ml) **IV***



Répéter naloxone 0,4 mg (0,4 ml) **IV*** aux
2 minutes jusqu'à FR ≥ 8/min ou dose
cumulative maximale 10 mg (10 ml).

* Si voie IV non disponible, utiliser voie SC jusqu'à ce qu'une
veine soit ouverte (voir OC chlorure de sodium 0,9% IV gvo).

D

Adultes et personnes âgées

Naloxone 1 mg/ml solution injectable

0,4 mg (0,4 ml) **IV*** aux 2 minutes jusqu'à dose cumulative maximale : 10 mg ou jusqu'à ce que la FR adéquate \geq 8/min.

* Si voie IV non disponible, utiliser voie SC jusqu'à ce qu'une veine soit ouverte (voir OC chlorure de sodium 0,9% IV gvo).