

## ORDONNANCE COLLECTIVE D'INITIATION D'UNE MÉDICATION

|  |  |
|--|--|
| <b>OBJET</b> : Administration de <b>PHOSPHATES DE SODIUM</b> (Fleet)                                   | <b>EN VIGUEUR</b> : 2009-04-21   |
| <b>INDICATION</b> : Constipation (voir algorithme en vigueur).   | <b>RÉVISÉ</b> : 2014-04-10   |
| <b>CLIENTÈLE</b> : <u>Admise</u> enfants/adolescents/adultes/aînés, toutes déficiences                 | <b>APPROUVÉE PAR</b> :<br>Dre Caroline Bédard,<br>présidente du CMDP<br><br>Dr Benoit Dumais, chef du<br>département de pharmacie par<br>intérim |
| <b>RESTRICTION</b> : Hypersensibilité aux phosphates de sodium ou à toute autre composante du produit. | <b>Professionnels autorisés :</b><br><i>infirmières, infirmiers</i>  |

| <u>Situation clinique</u>   | <u>Médication</u>  | <u>Intervention</u> |
|---|--|---------------------|
| Constipation<br>(voir algorithme de la constipation occasionnelle en vigueur) | <p><b>Clientèle adulte</b><br/>120 ml en lavement rectal (bouteille de 130 ml)</p> <p><b>Clientèle enfant (2-12 ans)</b><br/>60 ml en lavement rectal (bouteille de 65 ml)</p> <p>Il n'est pas nécessaire de vider complètement la bouteille. Le flacon contient un surplus de solution pour compenser la quantité qui reste habituellement au fond.</p> <p>Il n'est pas nécessaire de chauffer le lavement; on peut l'utiliser à température ambiante.</p> <p>L'utilisateur doit maintenir la même position jusqu'à ce qu'un besoin urgent de défécation se fasse sentir, ce qui prend habituellement de 2 à 5 minutes.</p> |                     |