

<b>ORDONNANCE COLLECTIVE N° 8</b>	<b>DÉCIDER D'OUVRIR UNE VEINE OU DE LA MAINTENIR OUVERTE AU MOYEN D'UN SOLUTÉ GLUCOSÉ 5 % DANS L'EAU</b>
<b>Référence à un protocole :</b> oui <input type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Date de mise en vigueur :</b> Avril 2010
<b>Titre :</b>	<b>Date de révision :</b>
<b>PROFESSIONNELS HABILITÉS À EXÉCUTER L'ORDONNANCE ET SECTEUR(S) D'ACTIVITÉ(S) VISÉ(S) :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infirmières exerçant dans les secteurs d'activités suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Unités de soins;</li> <li>– Service de prélèvements et d'injections;</li> <li>– Bloc de consultations médicales.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Toute personne requérant des soins d'urgence.</li> </ul>	
<b>ACTIVITÉS RÉSERVÉES :</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.</li> <li>▪ Appliquer des techniques invasives.</li> <li>▪ Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.</li> <li>▪ Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitoring et les ajustements au plan thérapeutique infirmier.</li> </ul>	

**INDICATION/CONDITION  
D'INITIATION :**

- Pour toute personne dont l'état requiert d'ouvrir une veine en urgence (état de choc, hypotension sévère, brûlures étendues, etc.)

**INTENTION THÉRAPEUTIQUE :**

- Stabiliser la fonction circulatoire.

**CONTRE-INDICATION :**

- Aucune, même chez un diabétique.

**LIMITE/RÉFÉRENCE AU MÉDECIN :**

- Référer à un médecin en urgence.
- Si arrêt cardiorespiratoire, appeler le 5999 pour joindre l'équipe du Code Bleu et débiter les manœuvres de RCR.

**DIRECTIVES :**

- Évaluer la condition physique et mentale de la personne, notamment les signes vitaux et de niveau de conscience.
- Apporter le plateau pour l'installation d'un soluté (annexe I).
- Installer un Dextrose 5 % à un débit de 30cc/hre.
- Assurer la surveillance requise : signes vitaux, signes d'infiltration du site, surcharge respiratoire.



## PLATEAU POUR L'INSTALLATION D'UN SOLUTÉ

MATÉRIEL		NUMÉRO D'INVENTAIRE
<input type="checkbox"/>	1 soluté Dextrose 5 % 1000 ml *	6191098
<input type="checkbox"/>	1 tubulure à soluté *	6181350
<input type="checkbox"/>	3 cathéters Insyte – perfusion intraveineuse 22 G	6120515
	<b>ou</b>	
	3 cathéters intermittents sous-cutanés en Y 22 G	6120159
<input type="checkbox"/>	Garrots latex tissu (environ 20 \$)	6180355 9764970
<input type="checkbox"/>	Tampon de chlorhexidine (pour désinfecter la peau)	Pharmacie
<input type="checkbox"/>	Tampon d'alcool (pour désinfecter la tubulure lors d'une injection)	6181470
<input type="checkbox"/>	Gants jetables en latex petit moyen grand	6182192 6182194 6182195
<input type="checkbox"/>	Pansement transparent pour cathéter adhésif transparent 6 X 7cm (type Tégaderm ou OpSite)	6110075
<input type="checkbox"/>	Diachylon de type hypoallergène 2,5cm 5cm	6110760 6110770
<input type="checkbox"/>	Compresse stérile 5cm X 5cm	6110590

\* Il est de la responsabilité de chaque unité de vérifier régulièrement la date de péremption de ce matériel.

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Afin d'éviter toute confusion, le plateau à soluté ne doit pas être placé dans le présentoir du matériel d'urgence.
- Référer à l'ordonnance collective n° 8 « *Décider d'ouvrir une veine ou la maintenir ouverte au moyen d'un soluté glucosé 5 % dans l'eau* ».