

## Traitements indiqués, remarques<sup>1</sup>

ANTIBIOTIQUES EN 1 <sup>re</sup> INTENTION		
<b>Sulfaméthoxazole/ triméthoprime</b>	800/160 mg BID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contre-indiqué si allergie aux sulfamidés</li> <li>Éviter si utilisation de sulfaméthoxazole/triméthoprime dans les 3 derniers mois ou si histoire récente de résistance objectivée</li> <li>Ajuster la dose selon la fonction rénale</li> <li>Éviter si Clcr inférieure à 15 ml/min.</li> </ul>
<b>Nitrofurantoïne</b>	100 mg BID (MacroBID <sup>md</sup> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éviter si Clcr inférieure à 30 ml/min.</li> <li>Éviter chez les hommes</li> <li>Éviter chez les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée</li> </ul>
<b>Fosfomycine</b>	3 g.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traitement unidose</li> <li>Éviter chez les hommes</li> <li>Éviter chez les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée</li> <li>Considérer le coût élevé par rapport aux alternatives de traitement</li> </ul>
ALTERNATIVES EN 1 <sup>re</sup> INTENTION		
<b>Amoxicilline</b>	500 mg q 8 h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indiqué si sensibilité objectivée à l'antibiogramme</li> <li>Éviter chez les hommes</li> <li>Éviter chez les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée</li> <li>Ajuster selon la fonction rénale</li> </ul>
<b>Cephalexine</b>	250 à 500 mg QID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indiqué si sensibilité objectivée à l'antibiogramme</li> <li>Éviter chez les hommes</li> <li>Éviter chez les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée</li> <li>Ajuster selon la fonction rénale</li> </ul>
ANTIBIOTIQUES EN 2 <sup>e</sup> INTENTION		
<b>Ciprofloxacine</b>	250 mg BID	Chez les hommes, les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée, considérer 500 mg <b>BID</b> et ajuster la dose selon la fonction rénale.
<b>Levofloxacine</b>	250 mg DIE	Chez les hommes, les usagers fébriles ou si une douleur à l'angle costovertébral (« punch rénal ») est objectivée, considérer 500 mg <b>DIE</b> et ajuster la dose selon la fonction rénale.
ALTERNATIVE EN 2 <sup>e</sup> INTENTION		
<b>Amoxicilline/ clavulanate</b>	500 mg TID ou 875 mg BID	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non recommandé en 1<sup>re</sup> intention pour le traitement de l'infection urinaire.</li> <li>Ajuster la dose selon la fonction rénale.</li> </ul>

<sup>1</sup> Adapté de *Urinary tract Infections (UTI) in Older Adults*. <http://www.rxfiles.ca/rxfiles/uploads/documents/GeriRxFiles-UTI.pdf>