

## ORDONNANCE COLLECTIVE

**Objet : Initier l'administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le soulagement des nausées ou des vomissements**

	Version antérieure	Dernière version
<b>Recommandée par</b> Le comité directeur des ordonnances collectives et protocoles		2020-02-13
Le comité de pharmacologie		2019-12-11
Le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers		2019-12-12
<b>Adoptée par</b> Le comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens		2020-03-04

### PROFESSIONNEL(S) AUTORISÉ(S)

Les infirmières du CIUSSS de la Capitale-Nationale ou d'une agence de personnel exerçant au CIUSSS de la Capitale-Nationale qui possèdent la compétence professionnelle requise, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, les habiletés et le jugement clinique inhérent à l'activité exercée.

### DIRECTIONS PROGRAMMES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

X	Directions	Secteurs (préciser)
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction de santé publique (DSPu)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction du programme jeunesse (DJ)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction de la protection de la jeunesse	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction de l'enseignement et des affaires universitaires (DEAU)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction des programmes Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, et déficience physique (DI-TSA et DP)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction des programmes Santé mentale et Dépendance (DSMD)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction des soins infirmiers et de la santé physique (DSI)	
<input type="checkbox"/>	Direction des services professionnels (DSP)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Direction des services multidisciplinaires (DSM)	

### SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE

Usager de 2 ans ou plus présentant ou susceptible de présenter des nausées ou des vomissements.

### ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE VISÉE

- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique;
- Administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance.

## INDICATIONS

---

Présence ou possibilité de présenter :

- Des nausées;
- Des vomissements.

## INTENTION OU CIBLE THÉRAPEUTIQUE

---

Prévenir ou soulager :

- Les nausées;
- Les vomissements.

## CONTRE-INDICATIONS

---

Allergie ou hypersensibilité au dimenhydrinate ou à l'une des composantes du produit.

## PROTOCOLE MÉDICAL OU RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE MÉDICAL EXTERNE

---

Se référer au protocole médical : *Initier l'administration de dimenhydrinate pour la prévention ou le soulagement des nausées ou des vomissements.*

## LIMITES OU SITUATIONS EXIGEANT UNE CONSULTATION OBLIGATOIRE AUPRÈS D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

---

Avant d'initier l'ordonnance collective, l'infirmière doit consulter le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée dans les situations suivantes:

- Céphalée importante, suspicion de migraine;
- Douleur rétro-sternale;
- Suspicion d'occlusion intestinale;
- Vomissements fécaloïdes ou sanguinolents;
- Hypertrophie bénigne de la prostate mal contrôlée;
- Rétention urinaire ou histoire de rétention urinaire, sauf chez l'utilisateur porteur d'une sonde urinaire;
- Grossesse;
- Histoire de glaucome à angle étroit ou glaucome non spécifié;
- Histoire récente d'impact crânien;
- Risque élevé de chutes;
- Utilisation de 4 doses de dimenhydrinate dans les dernières 24h.
- Fièvre, diminution de l'état général\*;
- Douleur abdominale\*;
- Nausées ou vomissements persistants plus de 24h\*;
- Usager hémodialysé se référer à l'ordonnance collective disponible à cet effet.

\*Lorsque l'infirmière suspecte que ces signes et symptômes sont reliés à un épisode de gastro-entérite, une première dose de dimenhydrinate pourrait être administrée sans discussion préalable avec le médecin ou l'IPS. Cependant, l'efficacité du dimenhydrinate étant limitée en présence de gastro-entérite, l'infirmière devrait discuter avec le médecin traitant ou l'IPS avant d'administrer toute dose supplémentaire.

### Particularités

- Pour l'utilisateur suivi en oncologie, l'infirmière doit se référer à l'équipe spécialisée ou au médecin traitant.
- L'administration de certains médicaments par la voie rectale peut être contre-indiquée, par exemple chez les usagers immunosupprimés ou ayant subi une chirurgie rectale récente. Se référer à la méthode de soins infirmiers au besoin.

## COMMUNICATION AVEC LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ TRAITANT

---

Le médecin traitant ou l'IPS devrait être informé que l'usager a eu un épisode de nausées ou de vomissements, soulagé ou non par l'administration de dimenhydrinate. Cette information pourrait être transmise lors de la prochaine tournée médicale ou plus tôt, selon la situation et le contexte de pratique.

Chez les personnes âgées, les personnes fragiles et les usagers polymédicamentés, les nausées et les vomissements peuvent être reliés à la médication. Il est alors utile d'aviser le pharmacien afin d'effectuer une révision de la pharmacothérapie.

## OUTILS DE RÉFÉRENCE, SOURCES ET EXPERTS CONSULTÉS

---

Lexi-Drugs (2019). Dimenhydrinate (Lexi-Drugs), consulté en ligne via la bibliothèque de l'Université Laval, avril 2019.

IBM Micromedex (2019). Dimenhydrinate, consulté en ligne via la bibliothèque de l'Université Laval, avril 2019.

RxVigilance 3.0.18 (2019). Dimenhydrinate, monographie. |

## IDENTIFICATION DU MÉDECIN PRESCRIPTEUR

---

Non applicable.


## IDENTIFICATION DU MÉDECIN RÉPONDANT

---

Président du CMDP.

## VALIDATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE

---


  
Directrice des soins infirmiers et de la santé physique

2020-03-04

Date

## APPROBATION DE L'ORDONNANCE COLLECTIVE (obligatoire)

---

  
Président du CMDP

2020-03-04

Date