

POSOLOGIE : _____

1 ACTION DU MÉDICAMENT

- Ce médicament est un antiviral utilisé pour la prévention ou le traitement de certaines infections causées par des virus. Il entraîne leur destruction et empêche leur croissance.

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

- Conservez à température ambiante. **Ne jamais réfrigérer.**
- N'utilisez pas si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Il est important de **boire régulièrement** durant les jours de traitement pour assurer une bonne élimination du médicament et protéger ainsi vos reins.
- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

- Nausées et/ou vomissements, perte d'appétit
- Maux de tête
- Diarrhées

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée grave et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Un changement dans la fréquence ou la quantité des urines.
- Des tremblements, de l'agitation, de la confusion et de la difficulté à vous concentrer.
- Des nausées, vomissements qui persistent ou des crampes et douleurs abdominales sévères.

POSODOLOGY : _____

1 ACTION OF THE DRUG

- This medicine is an antiviral used for preventing and treating certain infections caused by viruses. It results in their destruction and prevents their growth.

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

- Store at room temperature. **Never refrigerate.**
- Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy, colored or if it contains suspended particles.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

- It is important to **drink regularly** during the days of treatment to ensure good elimination of the drug and thus protect your kidneys.
- Tell your pharmacist and your physician about the allergies you have before starting your treatment.
- It is important to complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better. Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.
- It is important to pass blood tests prescribed to you, if applicable, to allow the medical team to make sure the treatment is effective and safe.
- Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

- Nausea and/or vomiting, loss of appetite
- Headache
- Diarrhea

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

- Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.

OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS

- Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing. In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency department to you.
- Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®) without first talking to your pharmacist or your physician.
- Change in the frequency and quantity of urine.
- Tremor, agitation, confusion and difficulty concentrating.
- Persisting nausea or vomiting or severe cramps and abdominal pain.