

- Céfazoline
- Céfépime
- Céfotaxime
- Céfoxitine
- Ceftazidime
- Ceftobiprole
- Ceftriaxone
- Céfuroxime
- Ceftolozane + tazobactam

POSOLOGIE : _____

1 ACTION DU MÉDICAMENT

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- N'utilisez pas si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée ou si elle contient des particules en suspension.
- Il est possible que la solution devienne plus foncée lors de la conservation. Le changement de couleur ne modifie pas l'efficacité de votre traitement.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Mentionnez à votre pharmacien toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

- Nausées
- Crampes abdominales
- Selles molles, diarrhées

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée grave et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent ou des crampes et des douleurs abdominales sévères.

- Cefazolin
- Cefepime
- Cefotaxime
- Cefoxitin
- Ceftazidime
- Ceftobiprole
- Ceftriaxone
- Cefuroxime
- Ceftolozane/tazobactam

POSODOLOGY : _____

1 ACTION OF THE DRUG

- This medicine is an antibiotic that treats different infections caused by bacteria.

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

- Store in the middle of the refrigerator (on a shelf; avoid the fridge door).
- Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy or if it contains suspended particles.
- The solution may become darker when stored. Colour change does not alter effectiveness of your treatment.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

- It is important to complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better. Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.
- Tell your pharmacist and your physician about the allergies you have before starting your treatment.
- It is important to pass blood tests prescribed to you, if applicable, to allow the medical team to make sure the treatment is effective and safe.
- Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

- Nausea
- Abdominal cramps
- Loose stools, diarrhea

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

- Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.

OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS

- Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing.
In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency department to you.
- Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®) without first talking to your pharmacist or your physician.
- Persisting nausea or vomiting or severe cramps and abdominal pain.