

POSOLOGIE : _____

1 ACTION DU MÉDICAMENT

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- N'utilisez pas si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter un traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, vous devez compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

- Douleurs abdominales
- Selles molles, diarrhées

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- Des engourdissements ou des picotements au niveau des mains ou de la bouche.
- De la diarrhée grave et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.

POSODOLOGY : _____

1 ACTION OF THE DRUG

- This medicine is an antibiotic that treats different infections caused by bacteria.

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

- Store in the middle of the refrigerator (on a shelf; avoid the fridge door).
- Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy, colored or if it contains suspended particles.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

- Tell your pharmacist and your physician about the allergies you have before starting your treatment.
- You must complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better. Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.
- It is important to pass blood tests prescribed to you, if applicable, to allow the medical team to make sure the treatment is effective and safe.
- Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

- Abdominal pain
- Loose stools, diarrhea

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

- Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.

OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS

- Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing.

In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency department to you.

- Numbness or tingling in the hands or mouth.
- Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®) without first talking to your pharmacist or your physician.
- Nausea or vomiting that persists.