

POSOLOGIE : _____

1 ACTION DU MÉDICAMENT

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

- **Les sacs se conservent à la température ambiante (15–30°C) et à l’abri de la lumière.**
 - Sortez le sac de l’emballage en aluminium juste avant l’utilisation.
- N’utilisez pas si la date d’expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l’infection peut réapparaître.
- **La consommation d’alcool est contre-indiquée durant tout le traitement et jusqu’à 48 h après la fin du traitement** en raison d’une interaction majeure avec cet antibiotique. Attention, cette directive s’applique également aux préparations à base d’alcool (ex : sirop, rince-bouche, tonique, etc.). Cette interaction peut causer des maux de tête, des bouffées de chaleur, des nausées et/ou des vomissements très importants.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

- Nausées et/ou vomissements
- Diarrhées
- Maux de tête
- Étourdissements
- Goût métallique
- Couleur plus foncée de l’urine

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l’urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée grave et persistante. Évitez d’utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d’abord à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.

POSODOLOGY : _____

1 ACTION OF THE DRUG

- This medicine is an antibiotic that treats different infections caused by bacteria.

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

- **Infusion bags are stored at room temperature (15–30°C) and protected from light.**
 - Take the bag out from the foil packaging just before use.
- Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy, colored or if it contains suspended particles.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

- Tell your pharmacist and your physician about the allergies you have before starting your treatment.
- It is important to complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better. Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.
- **Alcohol consumption is contraindicated throughout treatment and up to 48 h after the end of the treatment** due to a major interaction with this antibiotic. Attention, this directive also applies to alcohol-based preparations (e.g., syrup, mouthwash, tonics, etc.). This interaction may cause very important headaches, hot flashes, nausea and/or vomiting.
- Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

- Nausea and/or vomiting
- Dizziness
- Diarrhea
- Metallic taste
- Headache
- Darker colour of urine

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

- Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.
- OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS**
- Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing. In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency department to you.
 - Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®) without first talking to your pharmacist or your physician.
 - Nausea or vomiting that persists.