

## INFO-MÉDICAMENT

### ANTIVIRAUX INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

Acyclovir

#### POSOLOGIE :

##### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antiviral utilisé pour la prévention ou le traitement de certaines infections causées par des virus. Il entraîne leur destruction et empêche leur croissance.

##### 2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Conservez à température ambiante. Ne jamais réfrigérer.
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

##### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Il est important de **boire régulièrement** durant les jours de traitement pour assurer une bonne élimination du médicament et protéger ainsi vos reins.
- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

##### 4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements, perte d'appétit
- Maux de tête
- Diarrhée

##### 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

##### OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Un changement dans la fréquence ou la quantité des urines
- Des tremblements, de l'agitation, de la confusion et de la difficulté à vous concentrer.
- Des nausées, vomissements qui persistent ou des crampes et douleurs abdominales sévères.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.