

## INFO-MÉDICAMENT

### ANTIFONGIQUES INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

- Amphotéricine B       Anidulafungine       Caspofongine       Fluconazole

POSOLOGIE : \_\_\_\_\_

#### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est utilisé pour traiter différentes infections causées par un champignon.

#### 2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.
- Si l'amphothéricine B est le traitement que vous recevez, il est normal que la solution soit opaque et de couleur jaune éclatant.

#### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- **Aviser le médecin ou le pharmacien avant de débiter un médicament que vous ne consommez pas durant votre séjour à l'hôpital.**
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

#### 4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Diarrhées, douleur abdominale (maux d'estomac)
- Nausées et/ou vomissements
- Maux de tête
- Fièvre et frissons (amphotéricine et caspofongine)
- Des réactions liées à la perfusion (fièvre, frissons, nausées, vomissement, maux de tête) peuvent apparaître dans 1-2 heures après le début de la perfusion, mais perdent en intensité lors d'une utilisation continue.

#### 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Des nausées ou vomissements qui persistent.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.
- L'apparition de douleurs musculaires non expliquées et/ou des palpitations cardiaques.
- Des selles qui deviennent blanchâtres, si votre urine ou votre peau devient plus foncées ainsi que si le blanc de vos yeux sont plus jaunes.