

## **INFO-MÉDICAMENT**

### **CLINDAMYCINE INTRAVEINEUSE EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE**

**POSOLOGIE :** \_\_\_\_\_

**1. ACTION DU MÉDICAMENT :**

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

**2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :**

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

**3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :**

- Même si vous vous sentez mieux, vous devez compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Mentionnez à votre pharmacien et votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter un traitement.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

**4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :**

- Douleur abdominale
- Selles molles ou diarrhées
- Nausées et/ou vomissements
- Goût métallique

**5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :**

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

**OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :**

- L'apparition de fortes crampes abdominales et diarrhées sévères, nausée, vomissement, perte de poids et fatigue pendant ou après l'arrêt de l'antibiotique nécessite une consultation immédiate avec un médecin. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans l'accord d'un pharmacien ou d'un médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.