

INFO-MEDICAMENTO

DAPTOMICINA INTRAVENOSA EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

DOSIS: _____

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Guardar en el centro del refrigerador (sobre una repisa; evitar en la puerta del refrigerador).
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia o si contiene partículas en suspensión.
- Cabe mencionar que es normal que el medicamento tenga un color entre amarillo y parduzco.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Si es necesario, es importante hacerse los análisis de sangre que se le hayan prescrito para que el equipo médico pueda asegurarse de que el tratamiento es eficaz y seguro.
- Su médico puede pedirle dejar de tomar ciertos medicamentos para reducir el colesterol durante el tratamiento con daptomicina. Esta decisión es la correcta y reduce los posibles efectos secundarios.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Diarrea o estreñimiento
- Náuseas y/o vómitos
- Dolores de cabeza

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- La aparición de dolor, debilidad o sensibilidad muscular, entumecimiento o calambres, inexplicables.
- La aparición de fiebre y dificultad respiratoria inexplicable entre 2 y 4 semanas después del inicio del tratamiento.
- Náuseas o vómitos severos o persistentes.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.
- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.