

INFO-MEDICAMENTO

ANTIVIRALES INTRAVENOSOS EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

Ganciclovir

DOSIS:

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antiviral utilizado para prevenir o tratar ciertas infecciones causadas por virus. Los destruye e impide que crezcan.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Guardar en el centro del refrigerador (sobre una repisa; evitar en la puerta del refrigerador).
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Es importante **beber regularmente** durante el tratamiento para asegurar la correcta eliminación del medicamento. Además, cuando vaya al baño, es importante jalar la palanca del baño dos veces.
- Si manipula las bolsas de ganciclovir, **debe usar guantes**. Si el producto entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelos abundantemente.
- Todos los residuos (guantes, bolsas vacías, tubos) deben tirarse en una bolsa amarilla marcada "citotóxico" y llevarse al hospital.
- Si es necesario, es importante hacerse los análisis de sangre que se le hayan prescrito para que el equipo médico pueda asegurarse de que el tratamiento es eficaz y seguro.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada, si planea estarlo o si está en periodo de lactancia. Utilice un método anticonceptivo eficaz durante todo el tratamiento.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Dolores de cabeza, insomnio, fatiga
- Dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea o estreñimiento, náuseas, vómitos
- Dolor articular o muscular
- Tos o síntomas similares a los de un resfriado

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Cambios en la visión, dolor en los ojos o sensación de deslumbramiento por la luz.
- Signos de infección (escalofríos, dolor de garganta, tos).
- Un cambio en la frecuencia o en la cantidad de orina, o temblor, agitación, confusión y dificultad de concentración.
- Náuseas, vómitos o diarrea persistentes o calambres y dolores abdominales intensos. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.