

INFO-MÉDICAMENT

ANTIVIRAUX INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

Ganciclovir

POSOLOGIE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antiviral utilisé pour la prévention ou le traitement de certaines infections causées par des virus. Il entraîne leur destruction et empêche leur croissance.

2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Conservez au centre du réfrigérateur (sur une tablette; éviter la porte du réfrigérateur).
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Il est important de **boire régulièrement** au cours du traitement pour assurer une bonne élimination du médicament. De plus, lorsque vous allez aux toilettes, il est important de tirer la chasse d'eau à deux reprises.
- Si vous manipulez les sacs de ganciclovir, vous **devez porter des gants**. Si le produit entre en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez abondamment.
- Tous les déchets (gants, sacs vides, tubulures) doivent être jetés dans un sac jaune portant la mention «cytotoxique» et rapportés à l'hôpital.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte, si vous prévoyez le devenir ou si vous allaitez. Utilisez une méthode contraceptive efficace pendant tout votre traitement.

4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Maux de tête, insomnie, fatigue
- Douleur abdominale, perte d'appétit, diarrhée ou constipation, nausées, vomissements
- Douleur articulaire ou musculaire
- Toux ou symptômes s'apparentant à un rhume.

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- Un changement dans votre vision, une douleur aux yeux ou une sensation d'éblouissement à la lumière.
- Des signes d'infection (frissons, mal de gorge, toux).
- Un changement dans la fréquence ou la quantité des urines ou des tremblements, de l'agitation, de la confusion et de la difficulté à vous concentrer.
- Des nausées, vomissements ou diarrhées qui persistent ou des crampes et douleurs abdominales sévères. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.