

## INFO-MÉDICAMENT

### LINÉZOLIDE INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

POSOLOGIE : \_\_\_\_\_

#### 1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

#### 2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Les sacs se conservent à la température ambiante (15-30°C) et à l'abri de la lumière.
  - Sortir le sac de l'emballage en aluminium juste avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée ou si elle contient des particules en suspension.
- Il est possible que la couleur de l'antibiotique prenne une teinte jaunâtre devenant plus foncée en cours de traitement.

#### 3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débiter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- L'antibiotique peut réagir avec une substance naturellement présente dans certains aliments, la tyramine. On doit **éviter de consommer de grande quantité** de ces aliments. Les aliments riches en tyramine sont : les fromages vieillis, les viandes fermentées, la choucroute, la sauce soya, la bière en fût et le vin rouge.
- Aviser le médecin ou le pharmacien si vous prenez un antidépresseur au moment de commencer cet antibiotique OU avant de débiter un médicament que vous ne consommez pas durant votre séjour à l'hôpital.
- S'il y a lieu, il est important d'aller passer les prises de sang qui vous auront été prescrites afin de permettre à l'équipe médicale de s'assurer que le traitement est efficace et sécuritaire.
- Avertissez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

#### 4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements. Diarrhées ou constipation
- Maux de tête, étourdissements
- Hypertension (rare)
- Modification du goût et décoloration de la langue

#### 5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Des nausées ou vomissements importants ou qui persistent.
- Des engourdissements, des picotements ou une sensation de brûlure au niveau des bras ou des jambes
- L'apparition de fièvre, sueurs importantes, tremblements, confusion ou agitation.
- Une diminution ou un changement dans votre vision ou la sensation de vision brouillée.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.
- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium<sup>md</sup>) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.