

## INFO-MEDICAMENTO

### METRONIDAZOL INTRAVENOSO EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

DOSIS: \_\_\_\_\_

#### 1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

#### 2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Las bolsas deben conservarse a temperatura ambiente (15-30 °C) y protegidas de la luz.
  - Retire la bolsa del envase de aluminio justo antes de usarla.
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.

#### 3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- **El consumo de alcohol está contraindicado durante todo el tratamiento y hasta 48 horas después del final del mismo** debido a una importante interacción con este antibiótico. Cuidado, esta directiva también se aplica a las preparaciones a base de alcohol (por ejemplo, jarabes, enjuagues bucales, tónicos, etc.). Esta interacción puede causar fuertes dolores de cabeza, sofocos, náuseas y/o vómitos.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

#### 4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Náuseas y/o vómitos
- Diarrea
- Dolores de cabeza, aturdimiento
- Gusto metálico
- Orina de color más oscuro

#### 5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

##### ◦ UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.
- Náuseas o vómitos persistentes.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.