

INFO-MÉDICAMENT

MÉTRONIDAZOLE INTRAVEINEUX EN AMBULATOIRE OU À DOMICILE

POSOLOGIE : _____

1. ACTION DU MÉDICAMENT :

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2. CONSERVATION ET ADMINISTRATION :

- Les sacs se conservent à la température ambiante (15-30°C) et à l'abri de la lumière.
 - Sortir le sac de l'emballage en aluminium juste avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser si la date d'expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

- Mentionnez à votre pharmacien et à votre médecin toutes les allergies dont vous souffrez avant de débuter votre traitement.
- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l'infection peut réapparaître.
- **La consommation d'alcool est contre-indiquée durant tout le traitement et jusqu'à 48h après la fin du traitement** en raison d'une interaction majeure avec cet antibiotique. Attention cette directive s'applique également aux préparations à base d'alcool (ex : sirop, rince-bouche, tonique, etc.). Cette interaction peut causer des maux de tête, des bouffées de chaleur, des nausées et/ou des vomissements très importants.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4. EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés) :

- Nausées et/ou vomissements
- Diarrhées
- Maux de tête, Étourdissements
- Goût métallique
- Couleur plus foncée de l'urine

5. CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ :

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES :

- De la diarrhée sévère et persistante. Évitez d'utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d'abord à votre pharmacien ou votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.
- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l'urgence la plus près de chez vous.