

INFO-MEDICAMENTO

QUINOLONAS INTRAVENOSAS EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

Ciprofloxacina Levofloxacina Moxifloxacina

DOSIS: _____

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Las bolsas deben conservarse a temperatura ambiente (15-30 °C) y protegidas de la luz.
 - Retire la bolsa del envase de aluminio justo antes de usarla.
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Informe a su farmacéutico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Informe a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar cualquier medicamento que no estuviera tomando durante su estancia en el hospital.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Náuseas y/o vómitos
- Heces blandas, diarrea o estreñimiento
- Dolores de cabeza, problemas para dormir, sensación de cansancio.
- **Piel sensible al sol.** Aplíquese protección solar si se expone al sol.

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.
- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.
- Náuseas o vómitos persistentes.
- La aparición de los siguientes síntomas: dolor, sensación de ardor, hormigueo, entumecimiento, debilidad y cambios en la sensación del tacto en brazos y piernas.